

T-MSC
519
PER

ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL
INSTITUTO DE MATEMATICA

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS, DESCRIPCION Y ANALISIS

MONOGRAFIA

IA A LA OBTENCION DEL TITULO DE MAGISTER EN EDUCACION
MATEMATICA APLICADA AL NIVEL MEDIO

PRESENTADA POR:

ELIFIO VALERIO PEREZ BONOSO

GUAYAQUIL-ECUADOR
1994

M.C. GAUDENCIO ZURITA HERRERA

DIRECTOR DE MONOGRAFIA

RADECIMIENTO

A todas las Instituciones y personas preocupadas por el mejoramiento de la Educación en nuestro País que hicieron posible se realice este curso, en especial al Master Gaudencio Zurita Herrera mentalizador del mismo y a todos los profesores del curso que con sus sabias enseñanzas y ejemplos de probidad en todo momento supieron orientarme por el camino del mejoramiento constante.

ICATORIA

A mi esposa y a mi hija de
quienes en todo momento obtuve
el apoyo y motivación para
seguir adelante.

DECLARACION EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta monografía, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales)

INDICE

	pag.
Introducción	5
CAPITULO 1	
Espacio muestral y probabilidad	7
Espacio muestral y experimento	7
La función probabilidad	10
Probabilidad condicional	13
CAPITULO 2	
Variables aleatorias	16
Variables aleatorias discreta	17
Distribución de probabilidades de las variables aleatorias discretas.	18
Distribución acumulada de probabilidades	19
Valores esperados o esperanza matemática de una variable aleatoria.	22
Función generadora de momentos	23
Distribución Binomial	25
Media y varianza de la variable aleatoria binomial	28
Distribución Poisson	36
Distribución geométrica.	42
Tablas Estadísticas	46
Conclusiones	55
Bibliografía	56

INTRODUCCION

Históricamente los orígenes de la probabilidad se remontan al siglo XVI y, las primeras aplicaciones se relacionaban directamente con los juegos de azar. Actualmente, a más de las aplicaciones en los juegos de azar; los gobiernos, las empresas y organizaciones adoptan la teoría de probabilidad para la toma de decisiones.

El empleo de probabilidades indica que existe algún elemento aleatorio o de incertidumbre relativo a la ocurrencia o no ocurrencia de algún evento futuro. Así, en muchos casos, es prácticamente imposible predecir algo pero es posible establecer lo que podría pasar. Predecir cuanta demanda tendrá un producto nuevo, estimar el costo de la producción, pronosticar las fallas en las cosechas y comprar seguros, etc., son algunos de los ejemplos en que interviene un elemento aleatorio. Las probabilidades también pueden servirnos para desarrollar estrategias como por ejemplo, un inversionista estará más dispuesto a invertir su dinero si las probabilidades de ganar son buenas. Hasta ahora solo hemos referido a las probabilidades, tema que trataremos en el capítulo 1, aunque no en su verdadera dimensión, al final del capítulo también incluiremos definiciones básicas de Estadística como experimento, espacio muestral y sucesos pasaremos al estudio de función de probabilidad, una función que la consideramos fundamental para el desarrollo de nuestro tema, incluiremos también varios temas básicos referente a probabilidades.

l capítulo 2 entramos directamente al estudio de nuestro tema, cuya estructura básica está dada por definiciones y una serie de ilustraciones de la misma para su mejor comprensión. Primeramente desarrollaremos la teoría de variables aleatorias discretas y, seguidamente pasaremos al análisis de tres distribuciones de variables aleatorias discretas, esto es, distribución Binomial, distribución de Poisson y la distribución geométrica.

Al final de cada una de las distribuciones tratadas, incluiremos varias representaciones gráficas (lo cual no es común en los libros de Estadística por lo que lo consideramos nuestro aporte) de histogramas de distribución de probabilidades y de distribución acumulada de probabilidades con el objeto de poder visualizar el comportamiento de la distribución correspondiente.

Al final de la Monografía incluiremos también las tablas estadísticas de las distribuciones Binomiales y de Poisson.

Nuestro deseo es que este trabajo resulte lo más claro posible para el lector.

ESPOL
Instituto de Ciencias Matemáticas
BIBLIOTECA
"Ing. Homero Ortiz Egoz"

CAPITULO 1

ESPAZIO MUESTRAL Y PROBABILIDAD

esta sección trataremos de dar una definición de una acción básica en Estadística, la de experimento. Es posible usar que todas las personas en algún pasaje de nuestra existencia hayamos lanzado una moneda al aire para decidir una cuestión; lanzar un dado; de algún naípe sacar una carta mayor, medir la estatura de una persona, seleccionar en forma aleatoria de un grupo de frutas una cantidad prevista, etc., cada una de estas acciones, son algunos ejemplos de lo que en Estadística se conoce como experimento.

DEFINICION 1.0

Un proceso de medida es un experimento estocástico si y sólo si su resultado depende de la casualidad. Al experimento también se lo conoce como observación.

1 ESPACIO MUESTRAL Y EXPERIMENTO

DEFINICION 1.1

Al realizar un experimento cualquiera, espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de tal experimento, y se lo denota con la letra S.

Nota: Conceptualmente, el conjunto S, es el mismo conjunto que en otras ramas de la matemática se lo conoce como conjunto referencial o universo.

En la continuación, damos varias ilustraciones de la definición de espacio muestral.

Lancemos una moneda y veamos que lado sale en la cara superior. En este experimento los resultados posibles son cara o sello lo que quiere decir que $S = \{ \text{cara}, \text{sello} \}$ o brevemente $S = \{ c, s \}$.

amemos otros casos:

Láncese un dado y vea que número sale. En este experimento el espacio muestral S está constituido por las seis caras del dado, vamos a suponer que en nuestro caso presentamos a cada cara del dado por el número que tiene entonces $S = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$.

Si queremos medir por ejemplo, las estaturas de las personas de algún salón de clase nos encontramos con personas de diferentes estaturas, además las medidas que mos de cada una será aproximada, por lo que la misma persona si es medida por varias personas cada una de las didas resultará diferente, así si $X_{(1)}$ es la estatura de persona más baja y $X_{(n)}$ la estatura de la persona más alta entonces el espacio muestral de este experimento toma número infinito de elementos que en este caso una de la presentaciones es el intervalo de números reales $S = \{ x_{(1)} < x < x_n, x \in \mathbb{R} \}$.

Si alguna persona se para en una esquina y comienza a pedir la estatura de cada persona que pasa por ahí hasta

contrar una que mida, con una precisión de cero decimales, 8 cm, es posible que esto pudiera lograrlo con la primera o pase o con la segunda o con la tercera y así quizá deba esperar a que pase miles y miles de personas hasta lograr su objetivo, no sabiendo cuantas personas deberá medir, en este empleo si llamamos 0 al resultado no mide 178 cm y 1 al resultado mide 178 cm, entonces $S=\{1,01,001,0001,\dots\}$, en experimentos de este tipo, conviene tomar como espacio muestral al conjunto de los números naturales del que sabemos existe una cantidad infinita contable de elementos, entonces en estos experimentos $S = N = \text{conjunto de numeros naturales}$. Así, de los cuatro experimentos dados los dos primeros tienen espacios muestrales finitos, el cuarto tiene espacio muestral infinito contable y el tercero un espacio muestral infinito continuo. Y así en general un espacio muestral es discreto si tiene un número finito o infinito contable de elementos y es continuo si sus elementos(puntos) constituyen un continuo (ejemplo, todos los puntos sobre una línea, puntos de un segmento de línea, puntos de un semiplano, etc.).

todo subconjunto del espacio muestral S lo llamaremos evento, lo que como es natural implica que el conjunto vacío () es también un evento de S al que lo llamaremos evento imposible, además todo el espacio S muestral también es un evento al mismo que llamaremos evento seguro y, si dos eventos cualesquiera E_1, E_2 del espacio muestral S no tienen elementos comunes lo llamaremos eventos mutuamente

excluyentes, $E_1 \cap E_2 = \emptyset$.

Al conjunto de todos los subconjuntos de un espacio muestral S , lo denotaremos con la letra T . Así del ejemplo si $S = \{c,s\}$, entonces $T = \{\emptyset, \{c\}, \{s\}, \{c,s\}\}$. Cabe anotar que si S tiene n elementos entonces T tendrá 2^n elementos, que no es otra cosa que el conjunto potencia de S .

1.2. LA FUNCION PROBABILIDAD

Históricamente la probabilidad tiene su origen en los juegos de azar, como por ejemplo lanzar una moneda o un dado, sacar de un naípe una carta determinada, etc. Como ya vimos estas acciones son experimentos.

DEFINICION 1.2.1

Sea T el conjunto de todos los subconjuntos de un espacio muestral S y sean E_1, E_2 cualesquiera elementos de T , se denomina función probabilidad P a la función $P: T \rightarrow \mathbb{R}$ tal que cumple los siguientes axiomas:

- i. $\forall E_1, E_1 \in T, 0 \leq P(E_1) \leq 1$.
- ii. $P(S) = 1$.
- iii. $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$, si $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, donde $E_1 \cap E_2 = \{x / x \in E_1 \text{ y } x \in E_2\}$.

Definición que nos indica que: i.) Las probabilidades son números de 0 al 1, ii.) al espacio muestral se le asigna la probabilidad 1 y iii.) las funciones de probabilidad se evalúan sobre conjuntos y son aditivas.

teorema 1.

Si E_1 y E_2 son dos eventos cualesquiera:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2).$$

Prueba:

$$E_1 \cup E_2 = (E_1 - E_2) \cup (E_1 \cap E_2) \cup (E_2 - E_1)$$

$$\text{Entonces: } P(E_1 \cup E_2) = P(E_1 - E_2) + P(E_1 \cap E_2) + P(E_2 - E_1)$$

$$\text{yendo } P(E_1 \cap E_2) - P(E_1 \cap E_2) = 0$$

sumando esta cantidad al segundo miembro de la ecuación

tenemos:

$$(E_1 \cup E_2) = P(E_1 - E_2) + P(E_1 \cap E_2) + P(E_2 - E_1) + P(E_1 \cap E_2) - P(E_1 \cap E_1)$$

$$\text{Entonces: } P(E_1) = P(E_1 - E_2) + P(E_1 \cap E_2) \quad \text{y} \quad P(E_2) = P(E_2 - E_1) + P(E_1 \cap E_2)$$

Entonces:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) \text{ para todo } E_1, E_2 \in \mathcal{T}.$$

que es lo que se quería demostrar.

teorema 2

Si E es cualquier evento en S y E' el complemento de E

Entonces:

$$P(E') = 1 - P(E) \text{ para todo } E \in S.$$

Prueba.

$$E \cup E' = S \Rightarrow E' = S - E$$

$$\text{Entonces } P(E \cup E') = P(E) + P(E') = 1$$

Como E y E' son mutuamente excluyentes

$$\Rightarrow P(E) + P(E') = 1$$

$$\Rightarrow P(E') = 1 - P(E).$$

lo que demuestra el teorema.

corolario

La probabilidad del evento imposible es cero.

Prueba:

$$\emptyset \cup S = S$$

Porque $P(\emptyset \cup S) = P(\emptyset) + P(S) = 1$

$P(\emptyset) + P(S) = 1$

$P(\emptyset) = 1 - P(S)$

$P(\emptyset) = 1 - 1 = 0 \Rightarrow P(\emptyset) \equiv 0$

Teorema 3

Si E_1, E_2, \dots, E_n son eventos mutuamente excluyentes en un espacio muestral S , entonces :

$$(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n).$$

Prueba.

Esta demostración es inductiva Si $n = 1$, entonces:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = P(E_1), \text{ que trivialmente es cierto.}$$

Supongamos que el teorema es válido para $n=k$, es decir que:

$$(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_k)$$

Entonces se debe demostrar que también es válido para $k+1$, es decir:

$$(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k \cup E_{k+1}) = P(E_1) + \dots + P(E_k) + P(E_{k+1})$$

pero

$$P[(E_1 \cup \dots \cup E_k) \cup (E_{k+1})] = P[(E_1) + \dots + P(E_k)] + P(E_{k+1})$$

Haciendo la unión de conjuntos y la suma de probabilidades en los miembros respectivos de la ecuación tenemos:

$$P(E_1 \cup \dots \cup E_k \cup E_{k+1}) = P(E_1) + \dots + P(E_k) + P(E_{k+1})$$

en lo que queda demostrado el teorema.

3 PROBABILIDAD CONDICIONAL

DEFINICIÓN 1.3.1

Si los eventos E_1 y E_2 tienen sucesos en S y $P(E_2) \neq 0$, la probabilidad condicional de E_1 dado que ocurrió E_2 está dada por:

$$P(E_1/E_2) = P(E_1 \cap E_2)/P(E_2) \text{ y de la misma forma}$$

$$P(E_2/E_1) = P(E_2 \cap E_1)/P(E_1).$$

EJEMPLO 1.3.1

Supongamos los sucesos E_1 y E_2 de algún experimento, además se sabe que $P(E_1) = 0.30$ y la $P(E_1 \cap E_2) = 0.15$. Cuál es la probabilidad de que ocurra E_2 ?

SOLUCIÓN

$$P(E_1) = 0.30 \text{ y } P(E_1 \cap E_2) = 0.15$$

Aplicando la definición tenemos:

$$P(E_2) = 0.15/0.30 = 0.5.$$

EJEMPLO 1.3.2

Consideremos un experimento aleatorio en el que se pueden distinguir n casos igualmente probables. Supóngase que E_1 y E_2 son eventos que suceden k y q veces de estos casos respectivamente y $E_1 \cap E_2$ suceden m casos, entonces:

$$P(E_1) = k/n, \quad P(E_2) = q/n, \quad P(E_1 \cap E_2) = m/n$$

Si queremos encontrar la probabilidad $P(E_2/E_1)$, es decir la

Probabilidad de E_2 dado que ocurrió E_1 , aplicando la definición de probabilidad condicional tenemos que:

$$P(E_2/E_1) = \frac{s/n}{k/n} = m/k$$

Teorema 5

Si E_1 y E_2 son eventos en S , entonces :

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2/E_1) = P(E_2) \cdot P(E_1/E_2) \text{ si } P(E_1) \text{ y } P(E_2)$$

son diferentes de cero.

Ejemplo 1.3.3

En una aula de clase de 40 estudiantes 22 son hombres y el resto mujeres. Si se eligen dos alumnos aleatoriamente para que presidan una sesión. Cuál es la probabilidad de que ambos sean hombres?

Solución:

Como la elección fue hecha aleatoriamente, entonces todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, lo que implica que la probabilidad de que el primer alumno sea hombre es $22/40$, entonces la probabilidad de que el segundo elegido sea hombre será $21/39$ de ahí que, si E_1 es el evento primer alumno elegido y E_2/E_1 el evento segundo alumno elegido dado que el primero fué hombre, entonces:

$$P(E_1 \cap E_2) = (22/40)(21/39) = 0.29$$

En caso de que E_1 y E_2 sean eventos independientes esto es

$$P(E_1/E_2) = P(E_1) \text{ y } P(E_2/E_1) = P(E_2)$$

el teorema 5 se transforma en la siguiente

xpresión:

teorema 6

Si E_1 y E_2 son eventos independientes entonces :

$$(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2).$$

teorema que lo enunciamos, pero que no demostraremos.

ejemplo 1.3.4

uál es la probabilidad de extraer dos reyes rojos de un naipes, suponiendo que las extracciones son con reemplazo.

Solución.

sea E_1 el evento primera carta es un rey rojo

E_2 el evento segunda carta es un rey rojo

Como en el problema todas las cartas tienen igual probabilidad de ser elegidas y, por ser con reemplazo tenemos:

$$P(E_1) = P(E_2) = 2/52$$

$$\Rightarrow P(E_1 \cap E_2) = (2/52)(2/52) = 0.0015$$

Entonces la probabilidad de que las dos cartas sean reyes rojo es 0.0015.

Para el mismo caso, si el experimento fuera sin reemplazo tendríamos:

$$P(E_1) = 2/52, P(E_2) = P(E_2/E_1) = 1/51$$

$$\Rightarrow P(E_1 \cap E_2) = (2/52) \cdot (1/51) = .000754$$

CAPITULO 2

VARIABLES ALEATORIAS

una gran cantidad de problemas de Estadística nos resan una o varias cantidades, las mismas que están iadas a resultados de experimentos. Así por ejemplo de canasta llena de manzanas al inspeccionarlas solo nos le interesar la cantidad de manzana de color verde; al zar dos dados juntos una cierta cantidad de veces solo interese el número de veces que caen números iguales en cara superior. Podemos darnos cuenta que estos eros(cantidad de manzanas color verde, número de veces caen caras de igual número) dependen del azar, estos eros o valores son los que toma una variable aleatoria.

INICION 2.0

S el espacio muestral de un experimento cualquiera, una iable aleatoria X es una función $X:S \rightarrow R$ si y solo si a a elemento $s_1 \in S$ le asigna un número real.

conjunto de valores que X puede tomar se llama espacio stral de X .

istremos esta definición.

profesor organiza un juego con sus alumnos, el mismo que nsiste en lanzar un dado. Como sabemos $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

profesor llamó x al número que tiene el dado en su cara erior despues de ser lanazado y, acordaron, que si x es

ero par el profesor les paga a sus alumnos tres veces el
ero que sale y, si x es impar sus alumnos le pagan 100
es el número, es decir que:

$$x(1) = 100 \quad x(4) = -12$$

$$x(2) = -6 \quad x(5) = 500$$

$$x(3) = 300 \quad x(6) = -18$$

oncés, en este caso la variable aleatoria X puede tomar
icamente los valores 100, -6, 300, -12, 500 y -18.

1. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Las variables aleatorias pueden ser discretas o
ntinuas, en esta sección nos limitaremos al estudio de las
riables aleatorias discretas.

DEFINICION 2.1

Si X una variable aleatoria, X es una variable aleatoria
creta si y solo si toma un número de valores finitos o
finitos contable.

un intervalo (a, b) no contiene valor alguno de los que
ede tomar X , entonces diremos que $P(a < x < b) = 0$.

esentamos a continuación un ejemplo

ncemos un dado hasta que salga el número 1. Si damos el
lor 0 al evento no sale el número 1 y 1 al evento sale el
úmero 1, entonces: $S = \{1, 01, 001, 0001, \dots\}$. Si definimos
 X como número de veces que no sale el 1, tenemos:

$$x(1) = 0$$

01) = 1

001) = 2

0001) = 3

este experimento X es una variable aleatoria discreta
yo espacio muestral es el conjunto de los números enteros
positivos.

2 DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES DE LAS VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS.

DEFINICION 2.2.1

Sea $P(x=a)$ la probabilidad que la variable aleatoria
discreta X pueda tomar el valor a , una función $f(x) = P(x=x)$
es una distribución de probabilidades para X si y solo si
cumple lo siguiente::

$$0 \leq f(x) \leq 1 \quad y \quad \sum_{\text{toda } x} f(x) = 1$$

continuación presentamos una ilustración de esta
definición.

Sea X el número de las caras superior que se obtiene
después de lanzar un dado. Determinaremos de este ejemplo su
distribución de probabilidades.

Es fácil darse cuenta que cualquiera de las seis caras del
dado después de lanzarlo puede quedar en la parte superior,
lo que quiere decir que la variable aleatoria X puede tomar
cualquier uno de los seis números y, además sabemos que la

Probabilidad de que cualquiera de las caras quede en la parte superior es $1/6$, por lo que nuestra distribución de probabilidades es:

$$P(X=x) = \begin{cases} 1/6 & x = 1, 2, \dots, 6 \\ 0 & \text{resto de } X \end{cases}$$

fig.1 nos muestra en forma gráfica la distribución de probabilidades de la variable aleatoria X del ejemplo conocida como histograma de probabilidades de la variable




fig. 1

3 DISTRIBUCION ACUMULADA DE PROBABILIDADES

Si X es una variable aleatoria discreta su distribución acumulada de probabilidades se define como:

$$P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(x_i)$$

se denota por $F(x)$, esto es $F(x) = P(x \leq x_1)$.

$F(x)$ también se la conoce como función distribución.

, la distribución acumulada o función distribución de la estracción de la sección anterior esta dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1/6 & 1 \leq x < 2 \\ 2/6 & 2 \leq x < 3 \\ 3/6 & 3 \leq x < 4 \\ 4/6 & 4 \leq x < 5 \\ 5/6 & 5 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

fig. 2 es la representación gráfica de $F(x)$




fig.2

ra forma de representar una distribución de probabilidades es la dada en el ejemplo que sigue donde k es una constante.

emplo 2.3.1

$$a) P(X=x) = \begin{cases} kx^2, & x = 1, 2, 3, 4 \\ 0 \text{ resto de } x \end{cases}$$

función de probabilidades de la variable aleatoria X , termine:

El valor de k. b) $P(X=x)$, $F(x)$ y sus representaciones gráficas correspondientes. c) $P(x \geq 3)$ y $P(x < 3)$.

Solución

Por definición sabemos que:

$$\sum_{x=1}^4 kx^2 = 1$$

Sarrollando la sumatoria tenemos:

$$k1^2 + k2^2 + k3^2 + k4^2 = 1$$


$$\Rightarrow k(1 + 4 + 9 + 16) = 1$$

$$\Rightarrow k = 1/30.$$

$$f(x) = P(X=x) = \begin{cases} 1/30 x^2, & x = 1, 2, 3, 4 \\ 0, & \text{resto de } x \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1/30 & 1 \leq x < 2 \\ 5/30 & 2 \leq x < 3 \\ 14/30 & 3 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

Los gráficos de f y F son los que aparecen a continuación:



$$\begin{aligned}
 P(X \geq 3) &= P(X=3) + P(X=4) & P(X < 3) &= P(X=1) + P(X=2) \\
 &= 9/30 + 16/30 & &= 1/30 + 4/30 \\
 &= 25/30 & &= 5/30
 \end{aligned}$$

4 VALORES ESPERADOS O ESPERANZA MATEMATICA DE UNA VARIABLE ALEATORIA

DEFINICION 2.4

Sea X una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidades $P(X=x)$ y sea g una función de X , $E[g(x)]$ es el valor esperado o esperanza de g si y solo si:

$$E[g(x)] = \sum_{\text{toda } x} g(x) P(X=x)$$

- $g(x) = x$, entonces:

$$E[g(x)] = \mu = \sum_{\text{toda } x} x P(X=x)$$

donde μ es la media de la variable aleatoria X y es una medida de tendencia central.

$$\text{si } g(x) = (x-\mu)^2 \text{ entonces}$$

$$E[(X-\mu)^2] = \sigma^2 = \sum_{\text{toda } x} (x-\mu)^2 P(X=x)$$

donde σ^2 es denominada la varianza de la Variable aleatoria, que es una medida de dispersión de los valores que puede

somar la variable aleatoria X.

la raíz cuadrada positiva de σ^2 , es decir a σ la llamaremos desviación estandar de la variable aleatoria X respecto a μ .

Ejemplo 2.3.1

De la ilustración de la sección 2.2 encontrar μ , σ^2 y σ .

Solución

$\mu = \sum_{\text{todax}} x P(X=x)$ reemplazando los valores respectivos obtenemos:

$$\mu = \sum_{x=1}^4 x(1/30)x^2 = (1/30) (1^3+2^3+3^3+4^3)$$

$$\mu = 3.33$$

$\sigma^2 = \sum_{\text{toda } x} (x-\mu)^2 P(X=x)$ reemplazando los valores obtenemos

$$\sigma^2 = \sum_{\text{toda } x} (x-3.33)^2 (1/30) x^2$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = (1/30)((1-3.33)^2 1 + (2-3.33)^2 4 + (3-3.33)^2 9 + (4-3.33)^2 16)$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = 0.68$$

$$\text{por lo tanto } \sigma = 0.83$$

2.5 FUNCION GENERADORA DE MOMENTO

DEFINICION 2.7.1

Sea X una variable aleatoria discreta y sea $f(t) = e^{tx}$ una función de t, $M(t)$ es la función generadora de momentos de la variable aleatoria X si y solo si :

$$M(t) = E[e^{tx}] = \sum_{\text{toda } x} e^{tx} P(X=x)$$

pongamos que se puede derivar dentro del signo
ma, entonces obtendremos:

$$(t) = \frac{dM}{dt} = \sum_{\text{toda } x} x e^{tx} P(X=x)$$

si derivamos n veces obtenemos:

$$n(t) = \frac{d^n M}{dt^n} = \sum_{\text{toda } x} x^n e^{tx} P(X=x)$$

$t=0$, entonces la función exponencial vale 1, y la
expresión del miembro derecho es igual al n-ésimo momento,
cir:

$$M^n(0) = E[x^n].$$

Si $n = 1$

$$M'(0) = \mu = E[x]$$

$n = 2$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= M''(0) = \mu^2 \\ \text{como } \sigma^2 &= E[x-\mu]^2 = E[x^2 - 2\mu x + \mu^2] \\ &= E[x^2] - 2\mu E[x] + \mu^2 \\ &= E[x^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E[x^2] - \mu^2 \end{aligned}$$

$\sigma^2 = E[x^2] - (E[x])^2$, esto es

$$\sigma^2 \equiv M''(0) = (M'(0))^2.$$

6 DISTRIBUCION BINOMIAL

DEFINICION 2.8.1

do un experimento cualquiera , este experimento es binomial si y solo si consiste de un conjunto de n repeticiones tales que:

En cada repetición solo existen dos posibles resultados(suceso y fallo).

) La probabilidad de un suceso p , se mantiene constante durante todo el experimento.

i) Cada una de las repeticiones es independiente de las demás.

) El número de repeticiones n se fija antes de realizar el experimento.

do un experimento binomial y si la variable aleatoria X es igual al número de sucesos en las n repeticiones, entonces a se la conoce como variable aleatoria binomial.

omo X en un experimento binomial toma valores iguales al número de sucesos, entonces en el experimento podrá tomar valores de $0, 1, \dots, n$; siendo n el número de repeticiones.

sea un experimento binomial de cuatro repeticiones, supongamos que p es la probabilidad de un suceso y, $1-p$ la probabilidad de cada falla, entonces , podrán darse los siguientes casos:

si $x = 0$, es decir no ocurre sucesos tendremos:

sos \rightarrow $\frac{1-p}{-----}$ $\frac{1-p}{-----}$ $\frac{1-p}{-----}$ $\frac{1-p}{-----}$

$$P(X=0) = P^0 (1-p)^{4-0}$$

$x = 1$, un suceso tendremos:

soluciones \rightarrow $\frac{p}{x}$ $\frac{1-p}{-----}$ $\frac{1-p}{-----}$ $\frac{1-p}{-----}$

$P(X=1) = 4 P^1 (1-p)^{4-1}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$

$x = 2$, tenemos: $\frac{p}{x}$ $\frac{p}{x}$ $\frac{1-p}{-----}$ $\frac{1-p}{-----}$

taciones \rightarrow $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$

$\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$

$\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$

$\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$ $\frac{x}{-----}$

$$\rightarrow P(X=x) = 6 P^2 (1-p)^{4-2}$$

así podemos continuar sucesivamente, es decir:

$$(=3) = 4 P^3 (1-p)^{4-3}$$

$$(=4) = 4 P^4 (1-p)^{4-4}$$

asi en general si $x = n$, tenemos:

$$(=n) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

demás, en vista de que esta probabilidad se aplica a cualquier punto del espacio muestral que representa x -éxitos $n-x$ fallos(en cualquier orden específico), solo debemos contar cuantos puntos de esta clase existen y multiplicar $x(1-p)^{n-x}$ por este número. Es fácil darse cuenta que el número de sucesos en n repeticiones, es el número de combinaciones de x objetos seleccionados de n objetos, es decir:

$\binom{n}{x}$ de ahí qué se llega a la siguiente expresión:

$$P(X=x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & x = 0, 1, \dots, n \\ 0 & \text{resto de } x \end{cases}$$

que no es otra cosa que la denominada distribución de probabilidades de la variable aleatoria binomial, y que se denota como $b(x,n,p)$, es decir que:

$$P(X=x) = b(x,n,p).$$

Por lo tanto, de ahora en adelante cuando nos refiramos a $P(X=x)$, lo haremos con su equivalente $b(x,n,p)$. Donde b nos recuerde que nos estamos refiriendo a una variable aleatoria binomial; x es el número de sucesos en el experimento, n el número de repeticiones previamente fijada y p la probabilidad de que ocurra un suceso en cada repetición.

6.1 MEDIA Y VARIANZA DE LA VARIABLE ALEATORIA BINOMIAL

media μ y la varianza σ^2 de la distribución binomial

se las puede obtener a partir de la función generadora de momentos o en forma directa, para obtener la media μ hemos escogido $M(t)$:

$$M(t) = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

que podemos escribir como

$$M(t) = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x (1-p)^{n-x}$$

$$\text{Tenemos } (b+c)^a = \sum_k \binom{a}{k} b^{a-k} c^k$$

aciendo $b = 1-p$, $c = pe^t$, $a = n$ y $k = x$. obtenemos:

$M(t) = (pe^t + (1-p))^n$, derivando esta expresión nos queda:

$$M'(t) = n(pe^t + (1-p))^{n-1} pe^t$$

$$\Rightarrow M'(0) = n(p + (1-p))^{n-1} p$$

como $p + (1-p) = 1$ y $(1)^{n-1} = 1$, obtenemos:

$$M'(0) np = \mu$$

con lo que se demuestra que $\mu = np$

de la misma forma se puede demostrar que: $\sigma^2 = np(1-p)$.

Ejemplo 2.6.1

en cierta ciudad se da por hecho que los gastos médicos son la causa del 75 % de todas las quiebras personales.

Encuentre la probabilidad de que los gastos medicos sean la causa para dos de las cuatro próximas quiebras personales registradas en tal ciudad?. encontrar además μ , σ^2 , σ y dibújese el histograma y representación gráfica de la distribución acumulada F.

Solución

El problema nos dice que el 75% de la quiebras es por gastos médicos lo que equivale a decir que, cada quiebra que ocurre tiene una probabilidad de 0.75, de ser por gastos médicos es decir, que $p=0.75$; se nos pide la probabilidad de que de cuatro quiebras que ocurran dos sean por esta causa, es decir $n = \text{número de quiebras}$ y $x = \text{número de quiebras por gastos médicos}$; podemos darnos cuenta que nuestro problema se comporta igual que un experimento binomial por lo tanto:

$n = 4$, $x = 2$ y $p = 0.75$, entonces:

$$b(x, n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

emplazando los valores respectivos tenemos:

$$b(2, 4, 0.75) = \binom{4}{2} (0.75)^2 (1 - 0.75)^{4-2}$$

aciendo los cálculos respectivos obtenemos:

$$(2, 4, 0.75) = 0.21$$

$$\mu = np = 4 (0.75) = 3$$

$$\sigma^2 = np(1-p) = 3(1 - 0.75) = 0.75$$

$$\sigma = 0.86.$$

(x, n, p)




fig. 2.8.1

ando n es grande el cálculo de la probabilidades de las nomiales resulta tedioso . Por esta razón adjuntamos la tabla 1 al final del texto, la misma que contiene los valores de la distribución binomial y la correspondiente función de distribución acumulada($B(x, n, p)$) entre $n = 2$ y $= 20$.

tabla 1 proporciona los valores de $B(x, n, p) = \sum_{x=0}^n b(x, n, p)$
ra $x = 0, 1, \dots, n$ en forma directa.

os valores de $b(x, n, p)$, se pueden obtener restándole a $x, n, p)$ $B(x-1, n, p)$ que es el número que se encuentra en la misma columna de $B(x, n, p)$ en su parte anterior, todo esto en tabla 1. Más claro $b(x, n, p) = B(x, n, p) - B(x, n, p)$.

mplo 2.6.2

léese la tabla 1 para calcular:

$$B(8, 16, 0.40); \quad b) \quad b(9, 12, 0.40); \quad c) \quad \sum_{x=4}^n b(x, 20, 40)$$

ución

Este valor la tabla 1 como ya dijimos lo da en forma correcta, para esto en la tabla 1 buscamos los valores de n y y los mismos que se encuentran en las dos primeras columnas, primero bajamos por la columna de n hasta encontrar el número 16 y a su lado derecho seguidamente se encuentra el 0, en esta columna bajamos hasta encontrar el número 8, y por esta fila seguimos hacia la derecha hasta la columna numerada con 0.40 y nos encontraremos con el número 0.8577 es el resultado que buscamos, entonces:

$$B(8, 16, 0.40) = 0.8577$$

Como ya dijimos $b(9, 16, 0.40) = B(9, 16, 0.40) - B(8, 16, 0.40)$, buscamos los valores del segundo miembro de la ecuación en tabla 1 igual que como hicimos en a) y obtendremos que:
 $b(9, 16, 0.40) = 0.9417 - 0.8577 = 0.0840.$

$$\begin{aligned} \sum_{x=9}^{16} b(x, 16, 0.40) &= 1 - B(8, 16, 0.40) \\ &= 1 - 0.8577 \\ &= 0.1423. \end{aligned}$$


las próximas páginas presentamos varios histogramas de distribución de probabilidades y de distribución acumulada

e probabilidadades de la variable aleatoria binomial con el
objeto de visualizar el comportamiento de la misma , para
esto hemos tomado parámetros que hemos considerado
estratégicos para nuestro objetivo, esto es: para $n = 5$ y
probabilidadades $p = 0.2$, $p = 0.5$, y $p = 0.8$; para $n = 2$ y
probabilidadades $p = 0.3$, $p = 0.5$ y $p = 0.7$ y para $n = 20$
con probabilidadades $p = 0.1$, $p = 0.5$ y $p = 0.9$. De los
que podemos concluir que: para cualquier n la distribución
binomial será simétrica para la probabilidad $p = 0.5$;
desgada hacia la derecha para probabilidadades $p < 0.5$ y
desgada hacia la izquierda para probabilidadades $p > 0.5$. Lo
que el lector pude comprobar remitiendose a los gráficos
indicados anteriormente.


VARIABLE ALEATORIA BINOMIAL

istogramas de distribución
probabilidades para $n = 5$



(n, p)





Distribución acumulada de
probabilidades para $n = 5$



(n, p)




(n, p)




VARIABLE ALEATORIA BINOMIAL

Gráficas de distribución
probabilidades para $n = 12$


$$p = 0.30$$




Distribución acumulada de
probabilidades para $n = 12$




$$p = 0.50$$




$$p = 0.50$$



$$p = 0.70$$




$$p = 0.70$$




VARIABLE ALFATORIA BINOMIAL

ogramas de distribución
probabilidades para $n = 20$


(x, n, p)






(x, n, p)



(x, n, p)



Distribución acumulada de
probabilidades para $n = 20$



7 DISTRIBUCION POISSON

DEFICION 2.7.1

sea X una variable aleatoria discreta, X es una variable aleatoria Poisson si y solo si tiene la siguiente distribución de probabilidades:

$$P(x, \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \dots$$

onde λ es una constante real mayor que cero. y $\lambda = np$.

u media μ , esta dada por :

$$E[x] = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda}}{x!} \lambda^x = \lambda \quad \text{y}$$

$$\sigma^2 = E[(x-\mu)^2] = \sum_{x=0}^{\infty} (x-\mu)^2 \frac{e^{-\lambda}}{x!} \lambda^x =$$

óteses que la media de la variable aleatoria Poisson es igual a su varianza.

lgunos ejemplos característicos de los que se analizan a traves de la variable Poisson son: accidentes por día, llamadas telefónicas por minurtos, cantidad de ganado por as., etc, en los ejemplos indicados podemos darnos cuenta que la unidad de medición (tiempo-área) es continua pero que la variable aleatoria número de sucesos es discreta.

l uso de la variable Poisson supone lo siguiente:

i) La probabilidad de un éxito es la misma a traves de todo el campo de observación

ii) La probabilidad de más de un éxito durante cada uno de los pequeños intervalos del campo de observación es proximadamente cero.

i) La probabilidad de un éxito en cualquier intervalo es dependiente de lo que sucedió antes.

variable aleatoria Poisson puede tomar valores que van desde 0,1,2,... dependiendo de la cantidad de éxitos por intervalos continuos.

ra de las características de esta variable es que podemos escribir su distribución en forma total por medio de un parámetro, la media μ . De esta manera sabiendo que una variable aleatoria tiene resultados que son distribuidos mediante el método Poisson, y, conociendo el número de éxitos por unidad se puede determinar la probabilidad para cualquiera o todos los resultados posibles. A más de las aplicaciones que tiene esta variable como en los ejemplos descritos anteriormente, la distribución Poisson puede utilizarse para aproximar probabilidades binomiales, lo que es más conveniente cuando n es grande y la probabilidad p en cada ensayo tiende a cero, para utilizarla en la aproximación indicada, es necesario determinar solo la media de la distribución binomial.

La expresión que determina la distribución de probabilidades de la variable binomial, cuando $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$ mientras que $np = \lambda$ permanece constante, la expresión límite de la distribución binomial es igual a la expresión:

$$\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Expresión que no es otra cosa que la distribución Poisson con la que se aproxima probabilidades binomiales.

En vista de la múltiples aplicaciones importantes que tiene la distribución Poisson ha sido ampliamente tabulada.

El texto en la tabla 2 en su final, proporciona los valores de la distribución acumulada en forma directa, es decir:

$$F(x, \lambda) = \sum_{x_1 \leq x} f(x, \lambda) \text{ para valores de } x \text{ con incrementos que}$$

varían de 0.02 y 25, y su uso es muy similar al de la tabla 1.

Ejemplo 2.7.1

Utilícese la tabla 2 para determinar:

a) $F(9, 12)$; b) $f(9, 12)$; c) $\sum_{x=3}^{12} f(x, 12)$.

Solución

a) Este valor como dijimos antes lo proporciona la tabla en forma directa. Para lo cual en la parte superior encontramos los valores de x y en la primera columna los valores de λ .

Así: $F(9, 12) = 0.242$.

b) Al igual que en la binomial

$$f(x, \lambda) = F(x, \lambda) - F(x-1, \lambda)$$

$$\Rightarrow f(9, 12) = F(9, 12) - F(8, 12)$$

buscando los valores del segundo miembro de la ecuación en la tabla 2 sabremos que:

$$f(9, 12) = 0.242 - 0.155$$

$$f(9, 12) = 0.087.$$

c) $\sum_{x=3}^9 f(x, 12) = 1 - F(2, 12)$
 $= 1 - 0.576$
 $= 0.424$

Ejemplo 2.7.2

Si el 8 % de los fusibles depositados en un lote están defectuosos, úsese la aproximación de Poisson para determinar la probabilidad de que 4 fusibles estén defectuosos en una muestra aleatoria de 400.

Solución

$$p = 0.008 ; n = 400 ; x = 4 .$$

$$\Rightarrow \lambda = np = (0.008)(400) = 3.2$$

$$\text{como } f(x, \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Reemplazando los valores respectivos obtendremos:

$$f(4, 3.2) = \frac{(3.2)^4 e^{-3.2}}{4!} = 0.178$$

Calculando este valor en una tabla 2 obtenemos:

$$f(4, 3.2) = F(4, 3.2) - F(3, 3.2)$$

$$\Rightarrow f(4, 3.2) = 0.781 - 0.603$$

$$\Rightarrow f(4, 3.2) = 0.178$$

Entonces la probabilidad de que 4 fusibles estén defectuosos en la muestra es 0.178.


El lector podrá darse cuenta que el ejemplo que se terminó de dar, se analiza una situación que se comporta de manera similar que un experimento binomial por lo que pudo resolverse como tal, pero, si regresamos a él nos daremos cuenta que $n = 400$ (sumamente grande) y $p = 0.008$, es decir es sumamente pequeño, por lo que las características del

xperimento se prestan para que se lo resuelva por la proximación Poisson, como así lo pidió el problema, tratar de resolverlo como binomial es bastante engorroso.






l igual que como lo hicimos con la variable aleatoria binomial, en la página siguiente presentamos representaciones gráficas del histograma de distribución de probabilidades y de su correspondiente distribución acumulada de probabilidades de la variable aleatoria Poisson, de las que podemos concluir que casi toda la probabilidad se concentran alrededor de la media y que la probabilidad de observar grandes valores de la variable aleatoria es muy pequeña.

VARIABLE ALEATORIA POISSON

stogramas de distribución
probabilidades



Distribución acumulada
de probabilidades.



DISTRIBUCION GEOMETRICA

en el ejemplo 1.4 del primer capítulo, vimos que para encontrar a la primera persona que midiera 178 cm de estatura, se debía medir antes una cantidad indeterminada de personas, en este experimento cada persona a la que se le medía su estatura es un ensayo o repetición, es fácil darse cuenta que en experimentos como este n no puede ser fijada, como sí, se la fija en el experimento binomial característica única que lo diferencia del experimento binomial.

en problemas como el del experimento indicado deseamos calcular la probabilidad de que en una repetición determinada ocurra el primer suceso, es de esta clase de problemas que trataremos en esta sección.

DEFINICION 2.11.1

diseña X una variable aleatoria discreta, X es variable aleatoria geométrica si y solo si es igual al número de repeticiones necesarias para que ocurra el primer suceso. Se la denota por $g(x,p)$.

Si el primer suceso ocurre en la x -esima repetición, este tuvo precedido por $x-1$ fracasos y, si la probabilidad de suceso es p , entonces la probabilidad de $x-1$ fracasos en $x-1$ repeticiones es $(1-p)^{x-1}$. Si multiplicamos la probabilidad p de un suceso en la $x-1$ repetición por la probabilidad $(1-p)^{x-1}$ de $x-1$ fracasos, tendremos la probabilidad de obtener el primer suceso en la x -esima repetición, la misma que está dada por:

$$, p) = p (1-p)^{x-1} \quad \text{para } x = 1, 2, 3, \dots$$

presión que representa la distribución de probabilidades la variable aleatoria geométrica.

media u de la variable geométrica está dada por:

$$u = 1/p.$$


siguiente página nos muestra tres histogramas con su correspondiente distribución acumulada con el objeto de ver comportamiento de la variable aleatoria geométrica.

observar las gráficas nos daremos cuenta que: la probabilidad de que ocurra el primer suceso es mayor cuando número de repeticiones es menor y, esta probabilidad disminuyendo a medida que el número de repeticiones va aumentando.

VARIABLE ALEATORIA GEOMETRICA


stogramas de distribución
de probabilidades

$P(x=x)$




$$p = 0.10$$


Distribución acumulada de
probabilidades.




$P(x=x)$




$$p = 0.50$$



$P(x=x)$



$$p = 0.90$$



TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla I
FUNCION DE DISTRIBUCION BINOMIAL

$$B(x; n, p) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

n	x	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
2	0	0.9025	0.8100	0.7225	0.6400	0.5625	0.4900	0.4225	0.3600	0.3025	0.2500
	1	0.9975	0.9900	0.9775	0.9600	0.9375	0.9100	0.8775	0.8100	0.7975	0.7500
3	0	0.8574	0.7290	0.6141	0.5120	0.4210	0.3430	0.2740	0.2160	0.1664	0.1250
	1	0.9928	0.9720	0.9392	0.8960	0.8438	0.7810	0.7182	0.6480	0.5748	0.5000
4	0	0.8145	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164	0.2401	0.1785	0.1296	0.0915	0.0625
	1	0.9860	0.9477	0.8805	0.8192	0.7383	0.6517	0.5630	0.4752	0.3910	0.3125
5	0	0.7738	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0312
	1	0.9774	0.9185	0.8352	0.7373	0.6328	0.5282	0.4281	0.3370	0.2562	0.1875
6	0	0.7351	0.5314	0.3771	0.2621	0.1780	0.1176	0.0751	0.0467	0.0277	0.0156
	1	0.9672	0.8857	0.7763	0.6551	0.5339	0.4202	0.3191	0.2333	0.1636	0.1094
7	0	0.6978	0.4842	0.3527	0.2622	0.1911	0.1306	0.0743	0.0417	0.0243	0.0138
	1	0.9999	0.9987	0.9911	0.9830	0.9624	0.9295	0.8826	0.8208	0.7417	0.6562
8	0	0.6634	0.4305	0.2725	0.1678	0.1001	0.0570	0.0310	0.0168	0.0084	0.0039
	1	0.9428	0.8131	0.6572	0.5033	0.3671	0.2553	0.1691	0.1061	0.0632	0.0352
9	0	0.6302	0.3874	0.2316	0.1342	0.0751	0.0404	0.0207	0.0101	0.0046	0.0020
	1	0.9288	0.7748	0.5995	0.4302	0.3003	0.1960	0.1211	0.0705	0.0385	0.0195
10	0	0.6016	0.3470	0.2851	0.1782	0.0607	0.0428	0.0373	0.0218	0.0105	0.0088
	1	0.9117	0.7661	0.6144	0.4843	0.3207	0.2089	0.1482	0.0890	0.0464	0.0230
11	0	0.5700	0.3096	0.2316	0.1442	0.0611	0.0312	0.0183	0.0093	0.0046	0.0020
	1	0.9000	0.7994	0.6999	0.5999	0.4999	0.3999	0.2999	0.1999	0.0999	0.0499
12	0	0.5400	0.2800	0.2000	0.1200	0.0500	0.0200	0.0080	0.0030	0.0010	0.0005
	1	0.8800	0.7400	0.6400	0.5200	0.4000	0.2800	0.1800	0.1000	0.0500	0.0200
13	0	0.5100	0.2500	0.1700	0.0900	0.0400	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.8500	0.7100	0.6100	0.4900	0.3700	0.2500	0.1500	0.0800	0.0400	0.0100
14	0	0.4800	0.2200	0.1400	0.0600	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.8100	0.6700	0.5700	0.4500	0.3300	0.2100	0.1100	0.0500	0.0200	0.0050
15	0	0.4500	0.1900	0.1100	0.0400	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.7500	0.6000	0.4800	0.3600	0.2400	0.1200	0.0600	0.0300	0.0100	0.0000
16	0	0.4200	0.1600	0.0800	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.6800	0.5300	0.4100	0.2900	0.1700	0.0800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0000
17	0	0.3900	0.1300	0.0500	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.5500	0.4000	0.2800	0.1600	0.0800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0050	0.0000
18	0	0.3600	0.1000	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.4800	0.3500	0.2300	0.1100	0.0500	0.0200	0.0100	0.0050	0.0020	0.0000

TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla I
FUNCION DE DISTRIBUCION BINOMIAL (Continúa)

<i>n</i>	<i>x</i>	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	<i>p</i>	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
10	0	0.5987	0.3487	0.1969	0.1074	0.0563	0.0282	0.0135	0.0060	0.0025	0.0010	
	1	0.9139	0.7301	0.5143	0.3758	0.2440	0.1493	0.0860	0.0464	0.0232	0.0107	
	2	0.0885	0.0298	0.8202	0.0778	0.5256	0.3828	0.2616	0.1673	0.0906	0.0547	
	3	0.9000	0.9872	0.0500	0.8791	0.7759	0.6496	0.5138	0.3823	0.2660	0.1719	
	4	0.0999	0.0984	0.0001	0.9072	0.9219	0.8497	0.7515	0.6331	0.5044	0.3770	
	5	1.0000	0.0000	0.0986	0.9936	0.0803	0.0527	0.0051	0.8338	0.7381	0.0230	
	6	1.0000	1.0000	0.0999	0.9991	0.9965	0.9894	0.9740	0.9452	0.8980	0.8281	
	7	1.0000	1.0000	1.0000	0.0999	0.9996	0.9981	0.9952	0.9877	0.9720	0.9453	
	8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9995	0.9983	0.9955	0.9893	
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9990	
11	0	0.5088	0.3138	0.1073	0.0850	0.0122	0.0198	0.0088	0.0036	0.0014	0.0005	
	1	0.8081	0.6074	0.4122	0.3221	0.1971	0.1130	0.0600	0.0302	0.0130	0.0050	
	2	0.9848	0.9104	0.7788	0.0174	0.4552	0.3127	0.2001	0.1180	0.0652	0.0327	
	3	0.0984	0.0815	0.9306	0.8380	0.7133	0.5000	0.4250	0.2003	0.1911	0.1133	
	4	0.0999	0.0972	0.0841	0.0400	0.8854	0.7807	0.0083	0.5328	0.3971	0.2744	
	5	1.0000	0.0997	0.0973	0.0883	0.0657	0.9218	0.8513	0.7535	0.6331	0.5000	
	6	1.0000	1.0000	0.0997	0.0980	0.0924	0.9784	0.9400	0.9000	0.8202	0.7250	
	7	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9988	0.0957	0.9878	0.9707	0.9300	0.8867	
	8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9980	0.9941	0.9852	0.9673	
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9993	0.9978	0.9941	
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0008	0.9905		
12	0	0.5404	0.2824	0.1422	0.0087	0.0317	0.0138	0.0057	0.0022	0.0008	0.0002	
	1	0.8816	0.0590	0.4435	0.2749	0.1584	0.0850	0.0424	0.0190	0.0083	0.0032	
	2	0.9804	0.8891	0.7358	0.5583	0.3007	0.2528	0.1513	0.0834	0.0421	0.0193	
	3	0.0978	0.0744	0.0078	0.7040	0.0488	0.4925	0.3407	0.2253	0.1345	0.0730	
	4	0.0998	0.0957	0.0761	0.0274	0.8424	0.7237	0.5833	0.4382	0.3044	0.1938	
	5	1.0000	0.0995	0.0954	0.9806	0.9456	0.8822	0.7873	0.0052	0.5260	0.3872	
	6	1.0000	0.0999	0.0993	0.9961	0.9857	0.9614	0.9154	0.8418	0.7303	0.6128	
	7	1.0000	1.0000	0.0999	0.9994	0.9972	0.9905	0.9745	0.9427	0.8883	0.8062	
	8	1.0000	1.0000	1.0000	0.9990	0.9996	0.9983	0.9944	0.9847	0.9614	0.9270	
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9992	0.9972	0.9921	0.9807	
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9989	0.9968	
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	
13	0	0.5133	0.2542	0.1200	0.0550	0.0238	0.0097	0.0037	0.0013	0.0004	0.0001	
	1	0.8646	0.6213	0.3983	0.2336	0.1267	0.0637	0.0290	0.0120	0.0040	0.0017	
	2	0.0755	0.8661	0.6020	0.5017	0.3320	0.2025	0.1132	0.0579	0.0209	0.0112	
	3	0.0069	0.0658	0.8820	0.7473	0.5843	0.4200	0.2783	0.1080	0.0020	0.0161	
	4	0.0997	0.9935	0.9658	0.9009	0.7940	0.6543	0.5005	0.3530	0.2279	0.1334	
	5	1.0000	0.0991	0.0925	0.9700	0.9198	0.8346	0.7159	0.5744	0.4268	0.2905	
	6	1.0000	0.0990	0.0987	0.9930	0.9757	0.0370	0.8705	0.7712	0.6437	0.5000	
	7	1.0000	1.0000	0.0998	0.9988	0.9944	0.9818	0.9538	0.9023	0.8212	0.7005	
	8	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9990	0.9960	0.9874	0.9679	0.9302	0.8660	
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9903	0.9975	0.9922	0.9707	0.0539	
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9987	0.9950	0.9888	
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9883	
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	
14	0	0.4877	0.2288	0.1028	0.0440	0.0178	0.0068	0.0024	0.0008	0.0002	0.0001	
	1	0.8470	0.5846	0.3567	0.1979	0.1010	0.0475	0.0205	0.0081	0.0029	0.0009	

TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla I
FUNCION DE DISTRIBUCION BINOMIAL (Continua)

n	x	p									
		0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
14	2	0.9699	0.8416	0.6479	0.4481	0.2811	0.1608	0.0839	0.0398	0.0170	0.0065
	3	0.9858	0.9559	0.8535	0.6982	0.5213	0.3552	0.2205	0.1243	0.0632	0.0287
	4	0.9996	0.9908	0.9533	0.8702	0.7415	0.5842	0.4227	0.2793	0.1672	0.0898
	5	1.0000	0.9985	0.9885	0.9561	0.8883	0.7805	0.6405	0.4859	0.3373	0.2120
	6	1.0000	0.9998	0.9978	0.9884	0.9617	0.9067	0.8164	0.6925	0.5461	0.3953
	7	1.0000	1.0000	0.9997	0.9976	0.9897	0.9685	0.9247	0.8499	0.7414	0.6047
	8	1.0000	1.0000	1.0000	0.9996	0.9978	0.9917	0.9757	0.9417	0.8811	0.7890
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9983	0.9940	0.9825	0.9574	0.9102
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9980	0.9901	0.9880	0.9713
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9978	0.9935
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9991
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999
15	0	0.4633	0.2050	0.0874	0.0352	0.0134	0.0047	0.0010	0.0005	0.0001	0.0000
	1	0.8290	0.5400	0.3186	0.1671	0.0802	0.0353	0.0142	0.0052	0.0017	0.0005
	2	0.9638	0.8150	0.6042	0.3980	0.2301	0.1268	0.0617	0.0271	0.0107	0.0037
	3	0.9945	0.9444	0.8227	0.6482	0.4613	0.2969	0.1727	0.0905	0.0424	0.0170
	4	0.9994	0.9873	0.9383	0.8358	0.6805	0.5155	0.3519	0.2173	0.1204	0.0592
	5	0.0000	0.0078	0.0832	0.0380	0.0510	0.0210	0.0043	0.0013	0.0003	0.0000
	6	1.0000	0.9997	0.9964	0.9819	0.9434	0.8089	0.7548	0.6998	0.5422	0.3030
	7	1.0000	1.0000	0.9996	0.9958	0.9827	0.9500	0.8868	0.7800	0.6535	0.5000
	8	1.0000	1.0000	0.9999	0.9902	0.9958	0.9848	0.9578	0.9050	0.8182	0.6964
	9	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9992	0.9963	0.9878	0.9602	0.9231	0.8491
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9972	0.9907	0.9745	0.9408
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9995	0.9981	0.9937	0.9824
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9987	0.9980	0.9963
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9995
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
16	0	0.4401	0.1853	0.0743	0.0281	0.0100	0.0033	0.0010	0.0003	0.0001	0.0000
	1	0.8108	0.5147	0.2839	0.1407	0.0635	0.0201	0.0098	0.0033	0.0010	0.0003
	2	0.9571	0.7892	0.5614	0.3518	0.1971	0.0994	0.0451	0.0183	0.0060	0.0021
	3	0.9930	0.9310	0.7890	0.5981	0.4050	0.2450	0.1330	0.0651	0.0281	0.0100
	4	0.9991	0.9830	0.9209	0.7982	0.6302	0.4499	0.2892	0.1660	0.0853	0.0384
	5	0.0000	0.0067	0.0765	0.0183	0.8103	0.6508	0.4900	0.3288	0.1970	0.1051
	6	1.0000	0.0005	0.0044	0.0733	0.0201	0.8247	0.6881	0.5272	0.3600	0.2272
	7	1.0000	0.0009	0.0089	0.0930	0.0720	0.6256	0.8406	0.7161	0.5620	0.4018
	8	1.0000	1.0000	0.0008	0.0085	0.0025	0.0743	0.0320	0.8577	0.7441	0.5982
	9	1.0000	1.0000	1.0000	0.0008	0.0084	0.0029	0.0771	0.0417	0.8759	0.7728
	10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0007	0.0084	0.0038	0.0800	0.0514	0.8949
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0007	0.0087	0.0951	0.0851	0.0610
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0008	0.0001	0.0005	0.0801
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0004	0.0079
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0007
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
17	0	0.4181	0.1668	0.0331	0.0225	0.0075	0.0023	0.0007	0.0002	0.0000	0.0000
	1	0.7922	0.4818	0.2525	0.1182	0.0501	0.0103	0.0067	0.0021	0.0006	0.0001
	2	0.9497	0.7618	0.5193	0.3090	0.1637	0.0774	0.0327	0.0123	0.0041	0.0012
	3	0.9912	0.9174	0.7558	0.5480	0.3530	0.2019	0.1028	0.0464	0.0184	0.0064
	4	0.9988	0.9770	0.9013	0.7582	0.5739	0.3887	0.2348	0.1260	0.0500	0.0245

TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla I
FUNCION DE DISTRIBUCION BINOMIAL (*Continúa*)

n	x	p									
		0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
17	5	0.9999	0.9953	0.9681	0.8043	0.7053	0.5068	0.4197	0.2630	0.1471	0.0717
	6	1.0000	0.9992	0.9917	0.9023	0.8929	0.7752	0.6188	0.4478	0.2902	0.1002
	7	1.0000	0.9999	0.9983	0.9891	0.9598	0.8954	0.7872	0.6405	0.4743	0.3145
	8	1.0000	1.0000	0.9997	0.9974	0.9870	0.9597	0.9000	0.8011	0.6020	0.5000
	9	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9969	0.9873	0.9617	0.9081	0.8100	0.6855
	10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9968	0.9880	0.9652	0.9174	0.8338
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9970	0.9894	0.9699	0.9283
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9975	0.9914	0.9755
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9995	0.9981	0.9930
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9988
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
18	0	0.3072	0.1501	0.0536	0.0180	0.0050	0.0016	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
	1	0.7735	0.4503	0.2241	0.0991	0.0395	0.0142	0.0046	0.0013	0.0003	0.0001
	2	0.9119	0.7338	0.4797	0.2713	0.1353	0.0600	0.0238	0.0082	0.0025	0.0007
	3	0.9891	0.9018	0.7202	0.5010	0.3057	0.1646	0.0783	0.0328	0.0120	0.0039
	4	0.9985	0.9718	0.8704	0.7164	0.5187	0.3327	0.1880	0.0912	0.0411	0.0154
	5	0.9998	0.9936	0.9581	0.8671	0.7175	0.5344	0.3550	0.2088	0.1077	0.0481
	6	1.0000	0.9988	0.9882	0.9187	0.8610	0.7217	0.5491	0.3743	0.2258	0.1180
	7	1.0000	0.9998	0.9973	0.9837	0.9431	0.8503	0.7283	0.5634	0.3915	0.2403
	8	1.0000	1.0000	0.9995	0.9957	0.9807	0.9404	0.8600	0.7308	0.5778	0.4073
	9	1.0000	1.0000	0.9999	0.9991	0.9940	0.9790	0.9403	0.8653	0.7473	0.5927
	10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9988	0.9930	0.9788	0.9424	0.8720	0.7597
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9980	0.9938	0.9707	0.9103	0.8811
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9980	0.9942	0.9817	0.9519
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9987	0.9951	0.9810
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9900	0.9902
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9990
19	0	0.3774	0.1351	0.0450	0.0144	0.0042	0.0011	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
	1	0.7517	0.4203	0.1985	0.0829	0.0310	0.0104	0.0031	0.0008	0.0002	0.0000
	2	0.9335	0.7054	0.4413	0.2369	0.1113	0.0462	0.0170	0.0055	0.0015	0.0001
	3	0.9868	0.8850	0.6841	0.4551	0.2630	0.1332	0.0591	0.0230	0.0077	0.0022
	4	0.9980	0.9648	0.8550	0.6733	0.4054	0.2822	0.1500	0.0690	0.0280	0.0090
	5	0.9998	0.9914	0.9463	0.8369	0.6678	0.4739	0.2968	0.1020	0.0777	0.0318
	6	1.0000	0.9983	0.9883	0.9324	0.8251	0.6055	0.4812	0.3081	0.1727	0.0835
	7	1.0000	0.9997	0.9959	0.9707	0.9225	0.8180	0.6050	0.4878	0.3160	0.1706
	8	1.0000	1.0000	0.9992	0.9933	0.9713	0.9161	0.8145	0.6675	0.4940	0.3238
	9	1.0000	1.0000	0.9999	0.9984	0.9911	0.9074	0.9125	0.8139	0.6710	0.5000
	10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9977	0.9895	0.9653	0.9115	0.8159	0.6762
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9972	0.9880	0.9648	0.9129	0.8204
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9960	0.9884	0.9658	0.9165
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9900	0.9801	0.9682
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9972	0.9904
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9995	0.9978
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9996
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla I

FUNCION DE DISTRIBUCION BINOMIAL (*Continúa*)

<i>n</i>	<i>x</i>	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	<i>p</i>	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
20	0	0.3585	0.1216	0.0388	0.0115	0.0032	0.0008	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.7358	0.3917	0.1756	0.0692	0.0243	0.0076	0.0021	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
	2	0.9245	0.6769	0.4049	0.2061	0.0913	0.0355	0.0121	0.0036	0.0009	0.0002	0.0000
	3	0.9841	0.8670	0.6477	0.4114	0.2252	0.1071	0.0444	0.0160	0.0049	0.0013	0.0000
	4	0.9974	0.9568	0.8298	0.6296	0.4148	0.2375	0.1182	0.0510	0.0189	0.0059	0.0000
	5	0.9997	0.9887	0.9327	0.8042	0.6172	0.4164	0.2454	0.1256	0.0553	0.0207	0.0000
	6	1.0000	0.9970	0.9781	0.9133	0.7858	0.6080	0.4160	0.2500	0.1200	0.0577	0.0000
	7	1.0000	0.9996	0.9941	0.9679	0.8982	0.7723	0.6010	0.4150	0.2520	0.1316	0.0000
	8	1.0000	0.9999	0.9987	0.9900	0.9591	0.8867	0.7024	0.5056	0.4143	0.2517	0.0000
	9	1.0000	1.0000	0.9998	0.9974	0.9861	0.9520	0.8782	0.7553	0.5914	0.4119	0.0000
	10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9994	0.9961	0.9829	0.9468	0.8725	0.7507	0.5881	0.0000
	11	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9991	0.9949	0.9804	0.9435	0.8692	0.7483	0.0000
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9987	0.9940	0.9790	0.9420	0.8684	0.0000
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9985	0.9935	0.9786	0.9123	0.0000
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9984	0.9936	0.9703	0.0000
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9985	0.9941	0.0000
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9987	0.0000
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.0000
	18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000

TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla II
FUNCION DE LA DISTRIBUCION DE POISSON*

$$F(x; \lambda) = \sum_{k=0}^x e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$\lambda \backslash x$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.02	0.980	1.000								
0.04	0.961	0.999	1.000							
0.06	0.942	0.998	1.000							
0.08	0.923	0.997	1.000							
0.10	0.905	0.995	1.000							
0.15	0.861	0.990	0.999	1.000						
0.20	0.819	0.982	0.999	1.000						
0.25	0.779	0.974	0.998	1.000						
0.30	0.741	0.963	0.996	1.000						
0.35	0.705	0.951	0.994	1.000						
0.40	0.670	0.938	0.992	0.999	1.000					
0.45	0.638	0.925	0.989	0.999	1.000					
0.50	0.607	0.910	0.986	0.998	1.000					
0.55	0.577	0.894	0.982	0.998	1.000					
0.60	0.549	0.878	0.977	0.997	1.000					
0.65	0.522	0.861	0.972	0.996	0.999	1.000				
0.70	0.497	0.844	0.966	0.994	0.999	1.000				
0.75	0.472	0.827	0.959	0.993	0.999	1.000				
0.80	0.449	0.809	0.953	0.991	0.999	1.000				
0.85	0.427	0.791	0.945	0.989	0.998	1.000				
0.90	0.407	0.772	0.937	0.987	0.998	1.000				
0.95	0.387	0.754	0.929	0.984	0.997	1.000				
1.00	0.368	0.736	0.920	0.981	0.996	0.999	1.000			
1.1	0.333	0.699	0.900	0.974	0.995	0.999	1.000			
1.2	0.301	0.663	0.879	0.966	0.992	0.998	1.000			
1.3	0.273	0.627	0.857	0.957	0.989	0.998	1.000			
1.4	0.247	0.592	0.833	0.946	0.986	0.997	0.999	1.000		
1.5	0.223	0.558	0.809	0.934	0.981	0.996	0.999	1.000		
1.6	0.202	0.525	0.783	0.921	0.976	0.994	0.999	1.000		
1.7	0.183	0.493	0.757	0.907	0.970	0.992	0.998	1.000		
1.8	0.165	0.463	0.731	0.891	0.964	0.990	0.997	0.999	1.000	
1.9	0.150	0.434	0.704	0.875	0.956	0.987	0.997	0.999	1.000	
2.0	0.135	0.406	0.677	0.857	0.947	0.983	0.995	0.999	1.000	

* Con autorización de E.C. Molina, Poisson's Exponential Binomial Limit, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, N.J., 1947.

TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla II
FUNCION DE LA DISTRIBUCION DE POISSON (*Continua*)

$\lambda \backslash x$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	0.111	0.355	0.623	0.819	0.928	0.975	0.993	0.998	1.000	
2.4	0.091	0.308	0.570	0.779	0.904	0.964	0.988	0.997	0.999	1.000
2.6	0.074	0.267	0.518	0.736	0.877	0.951	0.983	0.995	0.999	1.000
2.8	0.061	0.231	0.469	0.692	0.848	0.935	0.976	0.992	0.998	0.999
3.0	0.050	0.199	0.423	0.647	0.815	0.916	0.966	0.988	0.996	0.999
3.2	0.041	0.171	0.380	0.603	0.781	0.895	0.955	0.983	0.994	0.998
3.4	0.033	0.147	0.340	0.558	0.744	0.871	0.942	0.977	0.992	0.997
3.6	0.027	0.126	0.303	0.515	0.706	0.844	0.927	0.969	0.988	0.996
3.8	0.022	0.107	0.269	0.473	0.668	0.816	0.909	0.960	0.984	0.994
4.0	0.018	0.092	0.238	0.433	0.629	0.785	0.889	0.949	0.979	0.992
4.2	0.015	0.078	0.210	0.395	0.590	0.753	0.867	0.936	0.972	0.989
4.4	0.012	0.066	0.185	0.359	0.551	0.720	0.844	0.921	0.964	0.985
4.6	0.010	0.056	0.163	0.326	0.513	0.686	0.818	0.905	0.955	0.980
4.8	0.008	0.048	0.143	0.294	0.476	0.651	0.791	0.887	0.944	0.975
5.0	0.007	0.040	0.125	0.265	0.440	0.616	0.762	0.867	0.932	0.968
5.2	0.006	0.034	0.109	0.238	0.406	0.581	0.732	0.845	0.918	0.960
5.4	0.005	0.029	0.095	0.213	0.373	0.546	0.702	0.822	0.903	0.951
5.6	0.004	0.024	0.082	0.191	0.342	0.512	0.670	0.797	0.886	0.941
5.8	0.003	0.021	0.072	0.170	0.313	0.478	0.638	0.771	0.867	0.929
6.0	0.002	0.017	0.062	0.151	0.285	0.446	0.606	0.744	0.847	0.916
	10	11	12	13	14	15	16			
2.8	1.000									
3.0	1.000									
3.2	1.000									
3.4	0.999	1.000								
3.6	0.999	1.000								
3.8	0.998	0.999	1.000							
4.0	0.997	0.999	1.000							
4.2	0.996	0.999	1.000							
4.4	0.994	0.998	0.999	1.000						
4.6	0.992	0.997	0.999	1.000						
4.8	0.990	0.996	0.999	1.000						
5.0	0.986	0.995	0.998	0.999	1.000					
5.2	0.982	0.993	0.997	0.999	1.000					
5.4	0.977	0.990	0.996	0.999	1.000					
5.6	0.972	0.988	0.995	0.998	0.999	1.000				
5.8	0.965	0.984	0.993	0.997	0.999	1.000				
6.0	0.957	0.980	0.991	0.996	0.999	0.999	1.000			

TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla II
FUNCION DE LA DISTRIBUCION DE POISSON (Continúa)

$\lambda \backslash x$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2	0.002	0.015	0.054	0.134	0.259	0.414	0.574	0.716	0.826	0.902
6.4	0.002	0.012	0.046	0.119	0.235	0.384	0.542	0.687	0.803	0.886
6.6	0.001	0.010	0.040	0.105	0.213	0.355	0.511	0.658	0.780	0.869
6.8	0.001	0.009	0.034	0.093	0.192	0.327	0.480	0.628	0.755	0.850
7.0	0.001	0.007	0.030	0.082	0.173	0.301	0.450	0.599	0.729	0.830
7.2	0.001	0.006	0.025	0.072	0.156	0.276	0.420	0.569	0.703	0.810
7.4	0.001	0.005	0.022	0.063	0.140	0.253	0.392	0.539	0.676	0.788
7.6	0.001	0.004	0.019	0.055	0.125	0.231	0.365	0.510	0.648	0.765
7.8	0.000	0.004	0.016	0.048	0.112	0.210	0.338	0.481	0.620	0.741
8.0	0.000	0.003	0.014	0.042	0.100	0.191	0.313	0.453	0.593	0.717
8.5	0.000	0.002	0.009	0.030	0.074	0.150	0.256	0.386	0.523	0.653
9.0	0.000	0.001	0.006	0.021	0.055	0.116	0.207	0.324	0.456	0.587
9.5	0.000	0.001	0.004	0.015	0.040	0.080	0.165	0.269	0.392	0.522
10.0	0.000	0.000	0.003	0.010	0.029	0.067	0.130	0.220	0.333	0.458
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.2	0.949	0.975	0.989	0.995	0.998	0.999	1.000			
6.4	0.939	0.969	0.986	0.994	0.997	0.999	1.000			
6.6	0.927	0.963	0.982	0.992	0.997	0.999	0.999	1.000		
6.8	0.915	0.955	0.978	0.990	0.996	0.998	0.999	1.000		
7.0	0.901	0.947	0.973	0.987	0.994	0.998	0.999	1.000		
7.2	0.887	0.937	0.967	0.984	0.993	0.997	0.999	0.999	1.000	
7.4	0.871	0.926	0.961	0.980	0.991	0.996	0.998	0.999	1.000	
7.6	0.854	0.915	0.954	0.976	0.989	0.995	0.998	0.999	1.000	
7.8	0.835	0.902	0.945	0.971	0.986	0.993	0.997	0.999	1.000	
8.0	0.816	0.888	0.936	0.966	0.983	0.992	0.996	0.998	0.999	1.000
8.5	0.763	0.849	0.909	0.949	0.973	0.986	0.993	0.997	0.999	0.999
9.0	0.706	0.803	0.876	0.926	0.959	0.978	0.989	0.995	0.998	0.999
9.5	0.645	0.752	0.836	0.898	0.940	0.967	0.982	0.991	0.996	0.998
10.0	0.583	0.697	0.792	0.864	0.917	0.951	0.973	0.986	0.993	0.997
	20	21	22							
8.5	1.000									
9.0	1.000									
9.5	0.999	1.000								
10.0	0.998	0.999	1.000							

TABLAS DE ESTADISTICA

Tabla II

FUNCION DE LA DISTRIBUCION DE POISSON (*Continua*)

$\lambda \backslash x$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.5	0.000	0.000	0.002	0.007	0.021	0.050	0.102	0.179	0.279	0.397
11.0	0.000	0.000	0.001	0.005	0.015	0.038	0.079	0.143	0.232	0.341
11.5	0.000	0.000	0.001	0.003	0.011	0.028	0.060	0.114	0.191	0.289
12.0	0.000	0.000	0.001	0.002	0.008	0.020	0.046	0.090	0.155	0.242
12.5	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005	0.015	0.035	0.070	0.125	0.201
13.0	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.011	0.026	0.054	0.100	0.166
13.5	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.008	0.019	0.041	0.079	0.135
14.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.014	0.032	0.062	0.109
14.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.010	0.024	0.048	0.088
15.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.008	0.018	0.037	0.070
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.5	0.521	0.639	0.742	0.825	0.888	0.932	0.960	0.978	0.988	0.994
11.0	0.460	0.579	0.689	0.781	0.854	0.907	0.944	0.968	0.982	0.991
11.5	0.402	0.520	0.633	0.733	0.815	0.878	0.924	0.954	0.974	0.986
12.0	0.347	0.462	0.576	0.682	0.772	0.844	0.899	0.937	0.963	0.979
12.5	0.297	0.406	0.519	0.628	0.725	0.806	0.869	0.916	0.948	0.969
13.0	0.252	0.353	0.463	0.573	0.675	0.764	0.835	0.890	0.930	0.957
13.5	0.211	0.304	0.409	0.518	0.623	0.718	0.798	0.861	0.908	0.942
14.0	0.176	0.260	0.358	0.464	0.570	0.669	0.756	0.827	0.883	0.923
14.5	0.145	0.220	0.311	0.413	0.518	0.619	0.711	0.790	0.853	0.901
15.0	0.118	0.185	0.268	0.363	0.466	0.568	0.664	0.749	0.819	0.875
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10.5	0.997	0.999	0.999	1.000						
11.0	0.995	0.998	0.999	1.000						
11.5	0.992	0.996	0.998	0.999	1.000					
12.0	0.988	0.994	0.997	0.999	0.999	1.000				
12.5	0.983	0.991	0.995	0.998	0.999	0.999	1.000			
13.0	0.975	0.986	0.992	0.996	0.998	0.999	1.000			
13.5	0.965	0.980	0.989	0.994	0.997	0.998	0.999	1.000		
14.0	0.952	0.971	0.983	0.991	0.995	0.997	0.999	0.999	1.000	
14.5	0.936	0.960	0.976	0.986	0.992	0.996	0.998	0.999	0.999	1.000
15.0	0.917	0.947	0.967	0.981	0.989	0.994	0.997	0.998	0.999	1.000

Tabla II
FUNCION DE LA DISTRIBUCION DE POISSON (*Continúa*)

$\lambda \backslash x$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	0.000	0.001	0.004	0.010	0.022	0.043	0.077	0.127	0.193	0.275
17	0.000	0.001	0.002	0.005	0.013	0.026	0.049	0.085	0.135	0.201
18	0.000	0.000	0.001	0.003	0.007	0.015	0.030	0.055	0.092	0.143
19	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.009	0.018	0.035	0.061	0.098
20	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.005	0.011	0.021	0.039	0.066
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.006	0.013	0.025	0.043
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.008	0.015	0.028
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.009	0.017
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.005	0.011
25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.006
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	0.368	0.467	0.566	0.659	0.742	0.812	0.868	0.911	0.942	0.963
17	0.281	0.371	0.468	0.564	0.655	0.736	0.805	0.861	0.905	0.937
18	0.208	0.287	0.375	0.469	0.562	0.651	0.731	0.799	0.855	0.899
19	0.150	0.215	0.292	0.378	0.469	0.561	0.647	0.725	0.793	0.849
20	0.105	0.157	0.221	0.297	0.381	0.470	0.559	0.644	0.721	0.787
21	0.072	0.111	0.163	0.227	0.302	0.384	0.471	0.558	0.640	0.716
22	0.048	0.077	0.117	0.169	0.232	0.306	0.387	0.472	0.556	0.637
23	0.031	0.052	0.082	0.123	0.175	0.238	0.310	0.389	0.472	0.555
24	0.020	0.034	0.056	0.087	0.128	0.180	0.243	0.314	0.392	0.473
25	0.012	0.022	0.038	0.060	0.092	0.134	0.185	0.247	0.318	0.394
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
16	0.978	0.987	0.993	0.996	0.998	0.999	0.999	1.000		
17	0.959	0.975	0.985	0.991	0.995	0.997	0.999	0.999	1.000	
18	0.932	0.955	0.972	0.983	0.990	0.994	0.997	0.998	0.999	1.000
19	0.893	0.927	0.951	0.969	0.980	0.988	0.993	0.996	0.998	0.999
20	0.843	0.888	0.922	0.948	0.966	0.978	0.987	0.992	0.995	0.997
21	0.782	0.838	0.883	0.917	0.944	0.963	0.976	0.985	0.991	0.994
22	0.712	0.777	0.832	0.877	0.913	0.940	0.959	0.973	0.983	0.989
23	0.635	0.708	0.772	0.827	0.873	0.908	0.936	0.956	0.971	0.981
24	0.554	0.632	0.701	0.768	0.823	0.868	0.904	0.932	0.953	0.969
25	0.473	0.553	0.629	0.700	0.763	0.818	0.863	0.900	0.929	0.950
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
19	0.999	1.000								
20	0.999	0.999	1.000							
21	0.997	0.998	0.999	0.999	1.000					
22	0.994	0.996	0.998	0.999	0.999	1.000				
23	0.988	0.993	0.996	0.997	0.997	0.999	1.000			
24	0.979	0.987	0.992	0.995	0.997	0.998	0.999	0.999	1.000	
25	0.966	0.978	0.985	0.991	0.994	0.997	0.998	0.999	0.999	1.000

CONCLUSIONES

Al haber terminado el presente trabajo concluimos que:

El conocimiento de la teoría de probabilidades, actualmente es imprescindible ya que a través ella se pueden desarrollar estrategias a seguir para el crecimiento de los pueblos.

La distribución de probabilidades de la variableatoria binomial se comporta en forma similar para cualquier n , esto es, para $p = 0.5$ el histograma tendrá una forma simétrica, para $p < 0.5$ sesgada hacia la derecha y para $p > 0.5$ sesgada hacia la izquierda.

En la distribución de probabilidades de la variableatoria Poisson, casi toda la probabilidad se concentra alrededor de su media y que la probabilidad de observar grandes valores es muy pequeña.

Resulta inconveniente los coeficientes binomiales cuando n es grande, puesto que en estos casos la distribución Poisson se comporta en forma semejante a la distribución binomial y por lo tanto es preferible aprovechar la facilidad de cálculo que presta la distribución Poisson para encontrar cualquier probabilidad.

BIBLIOGRAFIA

MILLER I.- FREUND J.- JOHNSON R., 1992 Probabilidad y estadística para ingenieros, 4^a edición, Ed. Prentice-Hall spanoamericana , México.

KREYSZIG E., 1976, Introducción a la Estadística, Ed. musa, Mexico, .

STEVENSON W., 1981, Estadística para administración y economía, Ed. Harla s.a., Mexico.

CHUNG K., 1983 Teoría elemental de la probabilidad y de procesos estocásticos , 3^a edición, Ed. Reverte, rcelona-España.

SANTALO L., 1980, Probabilidad e inferencia Estadística, edición, Colección de monografías (O.E.A), Washinton-E.U.U.