

Andrea Manzano
 Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

Live lesson

Examen Final de Farmacología y Nutrición Editar

September 7th 2020, 11:01 AM (4 hours ago)

Ver lección

Panel de datos



Precisión

52

Preguntas

55

Participantes

Participantes

Preguntas

Resumen

Temas



Imprimir



Descargar

Ordenar por: Orden de preg...

1. Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación Ampliar

a	Propranolol	47 participantes	85 %
b	Carbedilol	1 participantes	2 %
c	Atenolol	4 participantes	7 %
d	Nevibolol	1 participantes	2 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

2. Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada Ampliar

a	propanolol	1 participantes	2 %
b	metildopa	19 participantes	35 %
c	enalapril	27 participantes	49 %
d	salbutamol	5 participantes	9 %
	Sin intentar	3 participantes	5 %

3. ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? Ampliar

a	Enalapril	39 participantes	71 %
b	Salbutamol	8 participantes	15 %
c	Espironolactona	5 participantes	9 %
d	Metformina	1 participantes	2 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

4. Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: Ampliar

a	Identificación y eliminación de factores precipitantes	5 participantes	9 %
b	Establecimiento de los objetivos de la terapéutica	2 participantes	4 %
c	Minimización de los riesgos	1 participantes	2 %
d	Imaginar la lectrofisiología del corazón como un objetivo en movimiento	1 participantes	2 %
e	Todas las anteriores	45 participantes	82 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

5. Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...() Ampliar

a	Verdadero	52 participantes	95 %
b	Falso	2 participantes	4 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

Andrea Manzano
Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y medico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

a	Continuo con metformina	7 participantes	13 %
b	Añado insulina cristalina	2 participantes	4 %
c	Añado insulina NPH	45 participantes	82 %
d	añado otro ADO	0 participantes	0 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

7. Saxagliptina es un fármaco..

Ampliar

a	beta bloqueador	1 participantes	2 %
b	inhibidor de dispetilpeptidasa 4	45 participantes	82 %
c	inhibidor bomba sodio-potasio	2 participantes	4 %
d	inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal	6 participantes	11 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

8. Efecto Incretinico se refiere a

Ampliar

a	Efecto pleiotropico sistemico, mejorando la captación de glucosa,	2 participantes	4 %
b	disminuye el vaciamiento gastrico	1 participantes	2 %
c	mejora la secrecion de insulina	4 participantes	7 %
d	Favorece la diferenciación de los adipocitos	0 participantes	0 %
e	Todas las anteriores	46 participantes	84 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

9. De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

Ampliar

a	Obesidad	0 participantes	0 %
b	Tabaquismo pesado	0 participantes	0 %
c	Síndrome metabólico	0 participantes	0 %
d	Resistencia periférica a la insulina	1 participantes	2 %
e	Falla de células beta pancreáticas	52 participantes	95 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

10. ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)

Ampliar

a	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológica	25 participantes	45 %
b	Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico	42 participantes	76 %
c	Se recomienda el consumo de sal light en estos pacientes	10 participantes	18 %
d	Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.	22 participantes	40 %
	Sin intentar	10 participantes	18 %

11. El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:

Ampliar

Andrea Manzano
Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

Buscar

Informes

Lecciones nuevo



Enter Code

b Falso	45 participantes	82 %
Sin intentar	3 participantes	5 %

12. La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario

Ampliar

a Verdadero	53 participantes	96 %
b Falso	1 participantes	2 %
Sin intentar	1 participantes	2 %

13. Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h

Ampliar

a Diclofenaco	2 participantes	4 %
b Ketoprofeno	4 participantes	7 %
c Oxaprozina	46 participantes	84 %
d Paracetamol	2 participantes	4 %
Sin intentar	1 participantes	2 %

14. ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?

Ampliar

a Síndrome de Cushing	6 participantes	11 %
b Diabetes	0 participantes	0 %
c Hipertensión	2 participantes	4 %
d Enfermedad inflamatoria intestinal	44 participantes	80 %
Sin intentar	3 participantes	5 %

15. ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?

Ampliar

a Aumento de la excreción de calcio	3 participantes	5 %
b Estimulación del eje hipotalámico-hipófisis-adrenal	2 participantes	4 %
c Inhibición de la absorción de calcio	48 participantes	87 %
d Disminución de la producción de prostaglandinas	1 participantes	2 %
Sin intentar	1 participantes	2 %

16. tratamiento de primera línea para dolor neuropático

Ampliar

a AINES como paracetamol	14 participantes	25 %
b AINES como ibuprofeno	6 participantes	11 %
c OPIOIDE: codeína	7 participantes	13 %
d amitriptilina	24 participantes	44 %
Sin intentar	4 participantes	7 %

17. ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?

Ampliar

Andrea Manzano
Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

b	Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide	47 participantes	85 %
c	Un paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente durante 6 meses para la rinitis alérgica	1 participantes	2 %
d	Un paciente que recibe una inyección intraarticular de metilprednisolona para osteoartritis.	1 participantes	2 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

18. Un característica de un analgésico narcótico es: Ampliar

a	Es un derivado opiáceo.	1 participantes	2 %
b	Sirve para dolores que no han sido controlados con otros analgésicos	0 participantes	0 %
c	Se emplean para dolores intensos.	0 participantes	0 %
d	Todas las anteriores	50 participantes	91 %
	Sin intentar	4 participantes	7 %

19. Para el tratamiento ulceropéptico asociado por *H. pylori* señale la alternativa correcta Ampliar

a	Es necesario tratamiento antiácido	1 participantes	2 %
b	Se requiere un antisecretor	0 participantes	0 %
c	Se requiere antisecretor, con dos antibioticos	49 participantes	89 %
d	Se requiere un neutralizador del ácido	4 participantes	7 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

20. Efecto adverso de la metoclopramida Ampliar

a	Diarrea	6 participantes	11 %
b	Hiperexcitabilidad	1 participantes	2 %
c	Temblores	46 participantes	84 %
d	Estreñimiento	1 participantes	2 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

21. Eritropoyetina se produce en: Ampliar

a	Riñon	50 participantes	91 %
b	Médula Osea	3 participantes	5 %
c	Bazo	0 participantes	0 %
d	Todas	1 participantes	2 %
e	Ninguno	0 participantes	0 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

22. Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de: Ampliar

Andrea Manzano
Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

Buscar

Informes

Lecciones nuevo

9+

Enter Code

b	Proteínas	6 participantes	11 %
c	Grasas	0 participantes	0 %
d	Todas	10 participantes	18 %
e	Ninguno	36 participantes	65 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

23. Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina

Ampliar

a	Verdadero	52 participantes	95 %
b	Falso	2 participantes	4 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

24. LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA

Ampliar

a	Verdadero	48 participantes	87 %
b	Falso	6 participantes	11 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

25. Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.

Ampliar

a	Verdadero	7 participantes	13 %
b	Falso	47 participantes	85 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

26. Los desequilibrios de potasio afectan principalmente

Ampliar

a	El equilibrio osmolar	1 participantes	2 %
b	La conducción y función cardiaca	48 participantes	87 %
c	La función neuromuscular	5 participantes	9 %
d	La función gástrica	0 participantes	0 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

27. Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?

Ampliar

a	Clofibrato	38 participantes	69 %
b	Simvastatina	2 participantes	4 %
c	Gemfibrozilo	1 participantes	2 %
d	Ezetimiba	4 participantes	7 %
	Sin intentar	10 participantes	18 %

28. Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

Ampliar

b	Warfarina	5 participantes	9 %
c	Rivaroxabán	0 participantes	0 %
d	Ácido acetilsalicílico	4 participantes	7 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

29. El gemfibrozilo tiene como principal indicación:

Ampliar

a	Manejo de la hipoglicemia	0 participantes	0 %
b	Manejo de la Hiperlipidemia	5 participantes	9 %
c	Manejo de la Hipertrigliceridemia	47 participantes	85 %
d	Manejo de la Hipertension	0 participantes	0 %
	Sin intentar	3 participantes	5 %

30. Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

Ampliar

a	Ticagrelor	1 participantes	2 %
b	Enoxaparina	5 participantes	9 %
c	Alteplasa	43 participantes	78 %
d	Rivaroxabán	4 participantes	7 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

31. La combinación Combivir contiene:

Ampliar

a	Zidovudina + Lamibudina	53 participantes	96 %
b	Tenofovir + Emtricitabina	0 participantes	0 %
c	Abacavir + Didanosina	1 participantes	2 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

32. El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:

Ampliar

a	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml	8 participantes	15 %
b	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml	19 participantes	35 %
c	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml	10 participantes	18 %
d	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunist	8 participantes	15 %
	Sin intentar	10 participantes	18 %

33. Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?

Ampliar

a	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos	39 participantes	71 %
b	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos	6 participantes	11 %
c	Inhibidores de integrasas	1 participantes	2 %
d	Inhibidores de proteasas	6 participantes	11 %
	Sin intentar	3 participantes	5 %

34. Cual **NO** corresponde a un efecto adverso de los INNTI

Ampliar

Andrea Manzano
Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

Buscar

Informes

Lecciones nuevo

9+

Enter Code

b	Mielosupresion	2 participantes	4 %
c	Disminución de las enzimas hepáticas	49 participantes	89 %
d	Astenia-adinamia	1 participantes	2 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

35. Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es

Ampliar

a	Enfuvirtida	2 participantes	4 %
b	Dolutegravir	1 participantes	2 %
c	Amprenavir	1 participantes	2 %
d	Maraviroc	47 participantes	85 %
	Sin intentar	4 participantes	7 %

36. La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:

Ampliar

a	Pilonefritis	0 participantes	0 %
b	Sindrome Nefrótico	48 participantes	87 %
c	Sindrome Nefrítico	3 participantes	5 %
d	Litiasis	3 participantes	5 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

37. De los siguientes pacientes a cual **NO** le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:

Ampliar

a	Hemodialisis	2 participantes	4 %
b	Dialisis peritoneal	2 participantes	4 %
c	Transplantado	48 participantes	87 %
d	Farmacologico	2 participantes	4 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

38. Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la preescribiría a intensidad:

Ampliar

a	Alta	0 participantes	0 %
b	Leve	8 participantes	15 %
c	Moderada	46 participantes	84 %
d	Normal	0 participantes	0 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

39. Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

Ampliar

a	40%	0 participantes	0 %
b	60%	5 participantes	9 %
c	70%	3 participantes	5 %
d	100%	46 participantes	84 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

Andrea Manzano
Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

recomendable? a. Insulinas b. Metformina c. Inhibidores DPP4 d. Análogo GLP-1

a	A y D son correctas	5 participantes	9 %
b	B y C son correctas	4 participantes	7 %
c	Sólo A es correcta	41 participantes	75 %
d	A y B son correctas	4 participantes	7 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

41. Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?

Ampliar

a	Verdadero	44 participantes	80 %
b	Falso	9 participantes	16 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

42. ¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?

Ampliar

a	Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.	48 participantes	87 %
b	Aumentan el aporte de oxígeno al miocardio	2 participantes	4 %
c	Disminuir el espasmo coronario, aumento de flujo a través de la circulación	1 participantes	2 %
d	Una disminución de las resistencias periféricas y, por tanto, de la tensión arterial	3 participantes	5 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

43. Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

Ampliar

a	inmunosupresión	39 participantes	71 %
b	Antiinflamatorio y antipirético	4 participantes	7 %
c	inflamatorio	2 participantes	4 %
d	todas las anteriores	9 participantes	16 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

44. En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:

Ampliar

a	Producen menos tos como efecto adverso	29 participantes	53 %
b	Se administran en embarazadas	4 participantes	7 %
c	Son más potentes	7 participantes	13 %
d	No producen Hiperpotasemia	13 participantes	24 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

45. ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?

Ampliar

a	Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-	38 participantes	69 %
b	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos	10 participantes	18 %
c	Incrementan el volumen de orina eliminado	3 participantes	5 %
d	Aumentan la filtración glomerular	3 participantes	5 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

Andrea Manzano
Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

a	Metformina	2 participantes	4 %
b	Terapia combinada Metformina, GLP1	3 participantes	5 %
c	Metformina e insulina	30 participantes	55 %
d	Insulina	19 participantes	35 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

47. Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:

Ampliar

a	Nodulo sinoauricular	48 participantes	87 %
b	Haz de Hiz	2 participantes	4 %
c	Nodulo Auriculo ventricular	3 participantes	5 %
d	Nodulo Auriculo ventricular	1 participantes	2 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

48. El efecto que tiene la COX1 es principalmente

Ampliar

a	Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario	39 participantes	71 %
b	Efecto daño gñástrico y daño plaquetario	0 participantes	0 %
c	Efecto analgésico protector gástrico	6 participantes	11 %
d	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico	8 participantes	15 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

49. Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II

Ampliar

a	Tiazolidinediona	0 participantes	0 %
b	Insulina	1 participantes	2 %
c	GLP-1	0 participantes	0 %
d	Metformina	53 participantes	96 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

50. Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso

Ampliar

a	Insulina	0 participantes	0 %
b	Metformina	7 participantes	13 %
c	SGLT2 o GLP1	46 participantes	84 %
d	TZD	1 participantes	2 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

51. Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta

Ampliar

Andrea Manzano
Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

b	Pérdida de peso >15%, atención especialista y terapia farmacológica	2 participantes	4 %
c	Pérdida de peso estimada <10%, atención nutricional y luego atención médica	4 participantes	7 %
d	Pérdida de peso estimada >10%, atención nutricional y luego atención médico	5 participantes	9 %
	Sin intentar	1 participantes	2 %

52. Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes

Ampliar

a	Dietilpropion	0 participantes	0 %
b	Sibutramina	1 participantes	2 %
c	Orlistat	52 participantes	95 %
d	Fluoxetina	0 participantes	0 %
	Sin intentar	2 participantes	4 %

Quizizz

Examen Final de Farmacología y Nutrición

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

80

Accuracy %
(correct / total)

52

Number of
Questions







55

Number of Players

Players

Rank	Player Name	Avg. Time	Score	Accuracy	Correct / Total	
1	SofiA SalcaN (SofiA SalcaN)	13 secs	44100	● 89%	47 / 53	
2	Antonio Arellano (Antonio Giler)	14 secs	43760	● 87%	46 / 53	
3	Jefferson Vega (Jefferson Vega)	11 secs	42820	● 85%	45 / 53	
4	Doménica Chang	19 secs	42770	● 89%	47 / 53	
5	Anny Gonzalez (Anny Gonzalez Gonzalez)	25 secs	42690	● 91%	48 / 53	
6	Yaritza Sampedro (Yaritza Sampedro)	38 secs	40580	● 94%	50 / 53	
7	Cristhian Quijije (Cristhian Quijije)	32 secs	40320	● 91%	48 / 53	
8	Mildred Gordillo Vargas (Mildred Gordillo Vargas)	36 secs	40090	● 92%	49 / 53	
9	Ricardo Ortiz (Ricardo Ortiz Benavides)	31 secs	40080	● 87%	46 / 53	
10	Carolina C (Carolina CARRERA CHERREZ)	31 secs	39900	● 89%	47 / 53	
11	Domenica Poveda (Domenica Poveda)	22 secs	39900	● 85%	45 / 53	
12	Samantha Chavez (Samantha Chavez)	34 secs	39820	● 91%	48 / 53	
13	Katherine Carrera (Katherine Carrera)	29 secs	39420	● 85%	45 / 53	
14	Victoria Muñoz Yee (Victoria Muñoz Yee)	36 secs	39300	● 89%	47 / 53	
15	Emilly Chiriguay (Emilly Chiriguay)	34 secs	38930	● 85%	45 / 53	
16	Andrea Tenorio atenorio@espol.edu.ec (Andrea Tenorio)	37 secs	38820	● 89%	47 / 53	
17	Priscila Zamora (Kearly Zamora)	38 secs	38630	● 89%	47 / 53	
18	Bryan Cisneros (Bryan Cisneros)	31 secs	38550	● 87%	46 / 53	
19	Anahi Reyna dareyna@espol.edu.ec (Anahi Reyna)	35 secs	38300	● 85%	45 / 53	
20	tamara gonzalez (Tamara González)	32 secs	38140	● 83%	44 / 53	
21	maite murillo (Nohelia Murillo)	35 secs	38030	● 85%	45 / 53	

Rank	Player Name	Avg. Time	Score	Accuracy	Correct / Total	
22	daniela layana (Daniela Quiroz)	27 secs	37980	● 81%	43 / 53	
23	agustina delgado (agustina delgado m)	41 secs	37680	● 89%	47 / 53	
24	Ariana Alvarez (Ariana Alvarez)	36 secs	37620	● 85%	45 / 53	
25	Maria Lopez (María José Lopez Merino)	15 secs	37590	● 75%	40 / 53	
26	Michelle Sarmiento (Michelle Sarmiento)	35 secs	37540	● 83%	44 / 53	
27	Verónica Granda López	43 secs	37200	● 87%	46 / 53	
28	RAUL CAMACHO (RAUL CAMACHO)	44 secs	37110	● 87%	46 / 53	
29	Maite Santos	45 secs	36720	● 87%	46 / 53	
30	Juan Crespin (Juan Echeverria Crespin)	41 secs	36260	● 85%	45 / 53	
31	Mónica Cantos	41 secs	35750	● 85%	45 / 53	
32	Mirka Constantine	42 secs	35590	● 83%	44 / 53	
33	Danyely Shirley Salinas Díaz (Danyely Shirley Salinas D)	39 secs	35380	● 79%	42 / 53	
34	Luis Copo (Luis Alfredo Copo)	31 secs	35250	● 75%	40 / 53	
35	Carlos Aguilar G (Carlos Aguilar Gaibor)	41 secs	34110	● 79%	42 / 53	
36	Emily Ortiz (Emily Ortiz Merchan)	43 secs	34050	● 79%	42 / 53	
37	Noelia Vega (Noelia Vega Falcones)	31 secs	33730	● 74%	39 / 53	
38	Sthefany Guzhñay	46 secs	33270	● 79%	42 / 53	
39	Daniela Real	54 secs	33090	● 83%	44 / 53	
40	Tonny Andrade (Tony Andrade)	52 secs	29840	● 75%	40 / 53	
41	Gabriel Bermeo (Gabriel Bermeo)	59 secs	29500	● 77%	41 / 53	
42	Annie Mayorga (Annie Mayorga)	33 secs	28920	● 64%	34 / 53	
43	Leandro Cabrera (Leandro Cabrera)	37 secs	28490	● 64%	34 / 53	
44	Valery Guayas	50 secs	27760	● 66%	35 / 53	
45	wladimir alcivar briones (wladimir alcivar briones)	46 secs	27240	● 64%	34 / 53	
46	Emily Sánchez (Emily Sánchez)	18 secs	25270	● 53%	28 / 53	
47	Genesis Vite (Genesis Vite)	44 secs	25000	● 58%	31 / 53	
48	Orly Chavez	57 secs	20880	● 53%	28 / 53	
49	Eduardo Dueñas M	50 secs	20770	● 51%	27 / 53	

Rank	Player Name	Avg. Time	Score	Accuracy	Correct / Total	
50	Oscar Erazo	56 secs	20580	● 51%	27 / 53	
51	Harold Soledispa (Harold Soledispa)	52 secs	17260	● 45%	24 / 53	
52	Genesis Escalante (Genesis Escalante)	62 secs	16550	● 45%	24 / 53	
53	Maria Jose Suarez	53 secs	15510	● 40%	21 / 53	
54	Gardenia Garcia (Gardenia Garcia)	57 secs	15260	● 38%	20 / 53	
55	Carolina C (Carolina C)	-	0	● 0%	0 / 53	

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

90%

Student: SofiA SalcaN (SofiA SalcaN)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

47

✓ Correct

4

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	21 secs	860	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	28 secs	810	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	35 secs	760	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	10 secs	930	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	17 secs	880	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	16 secs	960	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	22 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	5 secs	960	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	4 secs	980	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	23 secs	850	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	3 secs	980	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	10 secs	910	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	7 secs	940	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	5 secs	980	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	33 secs	780	✓ amitriptilina
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	3 secs	990	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide

No.	Question	Time Taken	Score	Response
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	7 secs	950	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	3 secs	980	✓ Se requiere antisecretores, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	3 secs	980	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	2 secs	980	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	3 secs	980	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	17 secs	880	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	5 secs	960	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	13 secs	910	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	4 secs	970	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	13 secs	970	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	5 secs	990	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	3 secs	980	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	12 secs	970	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	2 secs	980	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	55 secs	0	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	6 secs	0	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	5 secs	970	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	2 secs	980	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	1 secs	990	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	4 secs	970	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	5 secs	990	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	2 secs	990	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Inhibidores DPP4d. Análogo GLP-1	3 secs	990	✓ Sólo A es correcta

No.	Question	Time Taken	Score	Response
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	54 secs	640	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	18 secs	960	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	3 secs	990	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	101 secs	0	Son más potentes
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	4 secs	980	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes perdítricos</u> con A1C > 8.5%	5 secs	980	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	3 secs	990	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	15 secs	900	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	2 secs	980	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	3 secs	990	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	48 secs	840	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	6 secs	920	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

88%

Student: Antonio Arellano (Antonio Giler)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

46

✓ Correct

6

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	23 secs	840	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	30 secs	800	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	20 secs	860	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	15 secs	900	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	4 secs	970	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	7 secs	980	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	12 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretinico se refiere a	6 secs	960	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	5 secs	980	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	108 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	11 secs	920	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	3 secs	980	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	8 secs	930	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	6 secs	940	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	6 secs	980	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	58 secs	0	AINES como paracetamol
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	13 secs	970	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide

No.	Question	Time Taken	Score	Response
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	6 secs	960	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	3 secs	980	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	6 secs	960	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	3 secs	980	✓ Riñon
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	3 secs	980	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	3 secs	980	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	2 secs	980	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	11 secs	930	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	4 secs	970	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	14 secs	960	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	6 secs	980	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	5 secs	970	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	15 secs	960	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	3 secs	980	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	52 secs	0	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	4 secs	0	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos
34	Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI	5 secs	970	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	3 secs	980	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	5 secs	970	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	4 secs	970	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	4 secs	990	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	2 secs	980	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	5 secs	980	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	33 secs	780	✓ Verdadero

No.	Question	Time Taken	Score	Response
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	6 secs	980	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	5 secs	980	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	111 secs	0	Se administran en embarazadas
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	5 secs	980	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	5 secs	980	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	3 secs	990	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	8 secs	940	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	2 secs	980	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	3 secs	990	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	54 secs	820	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	6 secs	920	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **86%**

Student: Jefferson Vega (Jefferson Vega)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

45

✓ Correct

7

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	42 secs	0	Atenolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	48 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	38 secs	740	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	12 secs	920	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	10 secs	930	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	12 secs	970	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	32 secs	780	✓ inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal
8	Efecto Incretínico se refiere a	8 secs	950	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	7 secs	970	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	39 secs	870	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	5 secs	960	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	4 secs	970	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	9 secs	920	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	6 secs	950	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	6 secs	980	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	13 secs	910	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	8 secs	980	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	6 secs	960	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	6 secs	960	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	5 secs	960	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	5 secs	960	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	7 secs	950	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	5 secs	960	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	3 secs	980	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	7 secs	950	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	6 secs	960	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	21 secs	0	Ezetimiba
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	10 secs	970	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	5 secs	960	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	11 secs	970	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	4 secs	970	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	26 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	4 secs	0	Inhibidores de proteasas
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	5 secs	960	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	4 secs	960	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	6 secs	960	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	5 secs	970	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	7 secs	980	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	4 secs	970	✓ 100%

No.	Question	Time Taken	Score	Response
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	11 secs	0	A y B son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	4 secs	970	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	8 secs	980	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	5 secs	980	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	8 secs	980	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	7 secs	970	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	25 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	3 secs	990	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	8 secs	950	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	3 secs	980	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	5 secs	980	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	7 secs	970	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	3 secs	960	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

90%

Student: Doménica Chang

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

47

✓ Correct

5

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	51 secs	660	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	32 secs	790	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	37 secs	750	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	15 secs	900	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	20 secs	870	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	20 secs	950	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	25 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	11 secs	920	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	15 secs	950	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	119 secs	600	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	22 secs	850	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	5 secs	950	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	19 secs	830	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	9 secs	920	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	18 secs	940	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	54 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	27 secs	940	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	11 secs	920	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	6 secs	960	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	8 secs	940	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	5 secs	970	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	5 secs	960	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	6 secs	960	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	5 secs	970	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	12 secs	920	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	7 secs	950	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	12 secs	970	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	11 secs	970	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	7 secs	950	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	14 secs	960	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	6 secs	960	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	58 secs	0	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	9 secs	0	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos
34	Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI	9 secs	940	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	4 secs	960	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	6 secs	960	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	5 secs	970	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	4 secs	990	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	2 secs	990	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	7 secs	980	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	58 secs	610	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	20 secs	950	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	4 secs	980	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	62 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	8 secs	970	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	6 secs	980	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	6 secs	980	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	56 secs	620	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	3 secs	970	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	2 secs	990	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	51 secs	830	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	6 secs	920	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **92%**

Student: Anny Gonzalez (Anny Gonzalez Gonzalez) Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

48

✓ Correct

4

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	15 secs	900	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	52 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	50 secs	660	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	7 secs	950	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	6 secs	960	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	10 secs	970	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	56 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	11 secs	930	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	8 secs	970	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	84 secs	720	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	4 secs	970	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	3 secs	970	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	6 secs	950	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	8 secs	930	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	15 secs	950	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	35 secs	0	AINES como paracetamol
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	6 secs	980	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide

No.	Question	Time Taken	Score	Response
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	11 secs	920	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	39 secs	740	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	10 secs	930	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	5 secs	970	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	15 secs	900	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	19 secs	870	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	16 secs	890	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	11 secs	930	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	18 secs	880	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	30 secs	930	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	18 secs	960	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	34 secs	770	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	42 secs	900	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	5 secs	960	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	55 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	25 secs	830	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	11 secs	920	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	21 secs	810	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	18 secs	880	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	20 secs	870	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	16 secs	960	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	10 secs	930	✓ 100%

No.	Question	Time Taken	Score	Response
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	42 secs	900	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	29 secs	810	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	26 secs	940	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	35 secs	880	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	59 secs	860	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	26 secs	910	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	84 secs	720	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	27 secs	910	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	32 secs	790	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	13 secs	890	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	75 secs	750	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	22 secs	920	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	11 secs	850	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

Student: Yaritza Sampedro (Yaritza Sampedro)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

96%

Accuracy % (correct / total)

52

Total Questions

50

✓ Correct

2

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	32 secs	780	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	59 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	39 secs	740	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	56 secs	630	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	38 secs	750	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	54 secs	880	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	56 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	51 secs	660	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	46 secs	840	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	118 secs	600	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	35 secs	760	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	6 secs	950	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	26 secs	770	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	11 secs	900	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	10 secs	960	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	56 secs	620	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	32 secs	920	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	36 secs	760	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	17 secs	880	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	20 secs	860	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	9 secs	940	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	31 secs	790	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	35 secs	770	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	10 secs	930	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	45 secs	700	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	36 secs	760	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	30 secs	930	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	37 secs	910	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	28 secs	810	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	38 secs	910	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	11 secs	930	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	60 secs	600	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	47 secs	680	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	30 secs	800	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	33 secs	700	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	9 secs	940	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	57 secs	620	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	14 secs	960	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	5 secs	960	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	12 secs	970	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	43 secs	710	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	38 secs	910	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	119 secs	600	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	33 secs	920	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	112 secs	620	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	62 secs	790	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	22 secs	920	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	27 secs	820	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	7 secs	930	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	36 secs	880	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	86 secs	710	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	8 secs	900	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

Student: Cristhian Quijije (Cristhian Quijije)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

92%

Accuracy % (correct / total)

52

Total Questions

48

✓ Correct

3

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	21 secs	860	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	59 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	49 secs	670	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	20 secs	870	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	27 secs	820	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	19 secs	950	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	50 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	39 secs	740	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	33 secs	890	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	120 secs	600	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	31 secs	790	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	4 secs	960	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	24 secs	790	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	9 secs	920	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	9 secs	970	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	55 secs	630	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	11 secs	970	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	37 secs	750	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	10 secs	930	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	9 secs	940	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	6 secs	960	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	10 secs	930	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	5 secs	0	Falso
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	5 secs	960	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	13 secs	910	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	32 secs	780	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊗
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	30 secs	930	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	43 secs	710	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	44 secs	900	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	6 secs	960	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	61 secs	600	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	39 secs	740	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	23 secs	840	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	34 secs	700	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	9 secs	940	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día posttratamiento de:	59 secs	610	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	9 secs	980	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	8 secs	950	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	10 secs	970	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	47 secs	690	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	19 secs	950	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	121 secs	600	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	30 secs	930	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	105 secs	650	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	67 secs	770	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	21 secs	930	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	27 secs	820	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	7 secs	930	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	38 secs	870	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	42 secs	860	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	8 secs	900	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

94%

Student: Mildred Gordillo Vargas (Mildred Gordillo Vargas)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

49

✓ Correct

3

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	20 secs	860	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	59 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	55 secs	630	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	54 secs	640	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	34 secs	770	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	39 secs	910	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	54 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	53 secs	650	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	54 secs	820	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	121 secs	600	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	34 secs	770	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	6 secs	950	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	39 secs	660	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	12 secs	900	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	15 secs	950	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	57 secs	620	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	39 secs	910	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	36 secs	760	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	19 secs	870	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	24 secs	840	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	6 secs	960	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	33 secs	780	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	41 secs	720	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	9 secs	940	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	15 secs	900	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	45 secs	700	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	24 secs	940	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	20 secs	0	Warfarina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	28 secs	810	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	25 secs	940	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	8 secs	950	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	58 secs	610	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	45 secs	700	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	30 secs	800	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	6 secs	940	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	17 secs	880	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	57 secs	620	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	10 secs	970	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	6 secs	960	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	11 secs	970	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	41 secs	720	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	10 secs	970	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	120 secs	600	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	28 secs	930	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	107 secs	640	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	69 secs	770	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	20 secs	930	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	17 secs	890	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	10 secs	910	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	31 secs	890	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	73 secs	750	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	8 secs	890	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **88%**

Student: Ricardo Ortiz (Ricardo Ortiz Benavides)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

46

✓ Correct

5

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	31 secs	790	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	49 secs	670	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	61 secs	600	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	37 secs	0	Identificación y eliminación de factores precipitantes
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	24 secs	840	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	45 secs	900	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	60 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	25 secs	830	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	28 secs	900	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	116 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	15 secs	900	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	5 secs	960	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	31 secs	730	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	8 secs	930	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	19 secs	930	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	61 secs	600	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	14 secs	970	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	33 secs	780	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	7 secs	950	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	3 secs	980	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	4 secs	970	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	5 secs	970	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	22 secs	850	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	3 secs	980	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	34 secs	770	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	6 secs	960	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	28 secs	930	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	38 secs	910	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	6 secs	960	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	17 secs	960	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	22 secs	850	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	56 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	24 secs	840	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	26 secs	820	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	6 secs	950	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	24 secs	840	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	8 secs	950	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	6 secs	980	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	5 secs	970	✓ 100%

No.	Question	Time Taken	Score	Response
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	56 secs	870	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	-	-	⊘
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	51 secs	880	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	36 secs	880	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	144 secs	0	Se administran en embarazadas
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	50 secs	830	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	27 secs	910	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	19 secs	930	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	52 secs	650	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	22 secs	810	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	22 secs	920	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	71 secs	760	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	6 secs	920	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

90%

Student: Carolina C (Carolina CARRERA CHERREZ)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

47

✓ Correct

3

✗ Incorrect

3

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	7 secs	950	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	9 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	42 secs	0	Salbutamol
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	52 secs	650	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	6 secs	960	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	12 secs	970	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	41 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasas 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	8 secs	940	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	12 secs	960	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	10 secs	930	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	22 secs	800	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	22 secs	810	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	18 secs	840	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	19 secs	930	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	45 secs	700	✓ amitriptilina
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	59 secs	870	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	32 secs	790	✓ Todas las anteriores

No.	Question	Time Taken	Score	Response
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	11 secs	920	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	21 secs	860	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	24 secs	840	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	27 secs	820	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	13 secs	910	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	26 secs	830	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	13 secs	910	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	26 secs	830	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	22 secs	950	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	21 secs	950	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	43 secs	710	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	34 secs	920	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	15 secs	900	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) está indicado en:	-	-	⊘
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	39 secs	740	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	14 secs	900	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	44 secs	610	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	26 secs	820	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	20 secs	860	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	25 secs	940	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	8 secs	940	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el más recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Inhibidores DPP4d. Análogo GLP-1	74 secs	830	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	16 secs	890	✓ Verdadero

No.	Question	Time Taken	Score	Response
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	31 secs	930	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	49 secs	830	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	161 secs	640	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	29 secs	900	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabético para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	103 secs	650	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	10 secs	960	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	48 secs	680	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	4 secs	960	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	67 secs	770	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	84 secs	720	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	9 secs	880	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **86%**

Student: Domenica Poveda (Domenica Poveda)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

45

✓ Correct

7

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	30 secs	800	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	33 secs	780	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	38 secs	750	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	36 secs	760	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	15 secs	900	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	61 secs	0	Continuo con metformina
7	Saxagliptina es un fármaco..	37 secs	750	✓ inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal
8	Efecto Incretinico se refiere a	19 secs	870	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	32 secs	890	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	73 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolíticoSe recomienda el consumo de sal light en estos pacientes
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	20 secs	870	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	12 secs	890	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	21 secs	820	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	29 secs	740	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	34 secs	880	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	33 secs	0	OPIOIDE: codeína

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	53 secs	880	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	13 secs	910	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	41 secs	720	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	11 secs	920	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	14 secs	900	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	24 secs	0	Proteínas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	7 secs	950	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	8 secs	940	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	10 secs	930	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	14 secs	900	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	21 secs	0	Gemfibrozilo
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	40 secs	0	Warfarina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	37 secs	750	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	6 secs	980	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	4 secs	970	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	53 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	13 secs	910	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	8 secs	940	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	5 secs	950	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	6 secs	960	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	33 secs	780	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	6 secs	980	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	9 secs	940	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	9 secs	980	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	16 secs	890	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a...?	7 secs	980	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardiaco, frecuencia y contractilidad cardiaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	7 secs	970	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	19 secs	950	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	12 secs	960	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	12 secs	960	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca:	11 secs	960	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	15 secs	900	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	10 secs	910	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	19 secs	930	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	42 secs	860	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	19 secs	740	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

Student: Samantha Chavez (Samantha Chavez)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

92%
Accuracy % (correct / total)

52

Total Questions

48

✓ Correct

3

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	24 secs	840	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	44 secs	710	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	46 secs	690	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	43 secs	710	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	42 secs	720	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	29 secs	930	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	42 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	24 secs	840	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	31 secs	890	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	12 secs	920	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	23 secs	790	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	15 secs	860	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	30 secs	740	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	22 secs	920	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	45 secs	700	✓ amitriptilina
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	103 secs	770	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	54 secs	640	✓ Todas las anteriores

No.	Question	Time Taken	Score	Response
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	22 secs	850	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	25 secs	830	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	4 secs	970	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	58 secs	0	Lípidos
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	38 secs	750	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	49 secs	670	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	21 secs	860	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	13 secs	910	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	56 secs	870	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	39 secs	910	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	40 secs	730	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	24 secs	940	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	29 secs	810	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	55 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	25 secs	830	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	11 secs	930	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	44 secs	610	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	19 secs	870	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	21 secs	860	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	60 secs	860	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	16 secs	890	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Inhibidores DPP4d. Análogo GLP-1	19 secs	950	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	21 secs	860	✓ Verdadero

No.	Question	Time Taken	Score	Response
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	43 secs	900	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	35 secs	880	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	29 secs	930	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	91 secs	690	✓ Impiden reabsorción de iones Na ⁺ , Cl ⁻
46	Tratamiento antidiabético para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	44 secs	850	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	32 secs	890	✓ Nódulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	49 secs	670	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	10 secs	910	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	39 secs	870	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m ² con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	11 secs	960	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	12 secs	840	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

86%

Student: Katherine Carrera (Katherine Carrera)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

45

✓ Correct

6

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	21 secs	860	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	10 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	42 secs	0	Salbutamol
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	39 secs	740	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	13 secs	910	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	10 secs	970	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	42 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	28 secs	810	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	11 secs	960	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	81 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	11 secs	920	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	8 secs	930	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	17 secs	850	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	12 secs	890	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	8 secs	970	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	40 secs	730	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	21 secs	950	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	33 secs	780	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	17 secs	890	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	12 secs	920	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	4 secs	970	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	30 secs	800	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	5 secs	960	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	6 secs	960	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	19 secs	870	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	37 secs	750	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	22 secs	950	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	22 secs	950	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	13 secs	910	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	47 secs	890	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	3 secs	980	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊖
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	27 secs	820	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	11 secs	920	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	12 secs	890	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	8 secs	940	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	4 secs	970	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	12 secs	970	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	3 secs	980	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	27 secs	0	A y D son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	13 secs	910	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	80 secs	820	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	51 secs	830	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	150 secs	660	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	108 secs	640	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	64 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	8 secs	970	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	45 secs	700	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	5 secs	960	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	72 secs	760	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	86 secs	710	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	8 secs	900	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

90%

Student: Victoria Muñoz Yee (Victoria Muñoz Yee)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

47

✓ Correct

5

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	7 secs	950	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	34 secs	770	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	60 secs	600	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	47 secs	690	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	46 secs	690	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	52 secs	880	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	44 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	26 secs	820	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	28 secs	900	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	119 secs	0	Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolíticoSe recomienda el consumo de sal light en estos pacientesHay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	30 secs	800	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	36 secs	680	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	46 secs	0	Ketoprofeno
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	9 secs	920	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	57 secs	810	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	55 secs	0	OPIOIDE: codeína

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	62 secs	860	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	50 secs	660	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	31 secs	790	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibioticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	7 secs	950	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	19 secs	870	✓ Riñon
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	8 secs	940	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	40 secs	730	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	22 secs	850	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	40 secs	730	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	16 secs	890	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	35 secs	920	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	43 secs	900	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	24 secs	840	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	19 secs	950	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	13 secs	910	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	62 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	38 secs	750	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	14 secs	900	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	18 secs	840	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	14 secs	910	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	15 secs	900	✓ Transplantado

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	15 secs	960	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	8 secs	950	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	52 secs	880	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	46 secs	690	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	30 secs	930	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	86 secs	710	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	26 secs	940	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	21 secs	930	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	116 secs	610	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	33 secs	890	✓ Nódulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	53 secs	650	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	7 secs	940	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	52 secs	820	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	32 secs	890	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	7 secs	910	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

Student: Emily Chiriguay (Emily Chiriguay)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

86%
Accuracy % (correct / total)

52

Total Questions

45

✓ Correct

7

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	34 secs	770	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	42 secs	0	salbutamol
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	53 secs	650	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	45 secs	700	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	29 secs	810	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	66 secs	850	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	45 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	10 secs	930	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	5 secs	980	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	82 secs	720	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	17 secs	890	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	5 secs	960	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	14 secs	880	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	7 secs	940	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	5 secs	980	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	54 secs	640	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	10 secs	970	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	20 secs	860	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	5 secs	970	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	16 secs	890	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	4 secs	970	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	3 secs	980	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	5 secs	960	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	12 secs	920	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	39 secs	0	Verdadero
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	6 secs	960	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	32 secs	930	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	25 secs	940	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	48 secs	680	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	49 secs	890	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	3 secs	980	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	57 secs	620	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	14 secs	910	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	28 secs	810	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	28 secs	750	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	18 secs	880	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	10 secs	930	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	8 secs	980	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	17 secs	880	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	20 secs	950	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	34 secs	770	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	123 secs	720	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	104 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	134 secs	700	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	90 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	106 secs	640	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	24 secs	920	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	55 secs	0	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	5 secs	950	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	15 secs	950	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	87 secs	0	Pérdida de peso estimada <10%, atención nutricional y luego atención médica
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	2 secs	970	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

90%

Student: Andrea Tenorio atenorio@espol.edu.ec (Andrea Tenorio)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

47

✓ Correct

4

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	11 secs	930	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	45 secs	700	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	42 secs	720	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	44 secs	710	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	38 secs	740	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	44 secs	900	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	59 secs	0	beta bloqueador
8	Efecto Incretínico se refiere a	24 secs	840	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	31 secs	890	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	119 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	21 secs	860	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	18 secs	840	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	19 secs	830	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	35 secs	690	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	19 secs	930	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	61 secs	600	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	32 secs	930	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	38 secs	750	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	18 secs	880	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	24 secs	840	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	25 secs	830	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	27 secs	820	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	30 secs	800	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	23 secs	850	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	22 secs	850	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	32 secs	780	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	42 secs	900	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	13 secs	970	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	29 secs	810	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	18 secs	960	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	15 secs	900	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊘
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	38 secs	750	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	20 secs	870	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	28 secs	750	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	32 secs	780	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	15 secs	900	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	22 secs	950	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	16 secs	890	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	65 secs	850	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	55 secs	630	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	51 secs	880	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	50 secs	830	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	141 secs	680	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	45 secs	850	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	53 secs	820	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	24 secs	920	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	63 secs	0	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	21 secs	810	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	19 secs	930	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	107 secs	0	Pérdida de peso estimada >10%, atención nutricional y luego atención médico
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	24 secs	680	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

90%

Student: Priscila Zamora (Kearly Zamora)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

47

✓ Correct

3

✗ Incorrect

3

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	50 secs	660	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	32 secs	790	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	36 secs	760	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	55 secs	630	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	22 secs	850	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	121 secs	730	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	51 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	46 secs	690	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	45 secs	850	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	24 secs	840	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	19 secs	830	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	29 secs	740	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	23 secs	800	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	37 secs	870	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	-	-	🕒
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	42 secs	900	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	44 secs	710	✓ Todas las anteriores

No.	Question	Time Taken	Score	Response
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	10 secs	930	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	13 secs	910	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	8 secs	940	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	3 secs	980	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	33 secs	780	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	5 secs	960	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	17 secs	890	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	11 secs	920	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	43 secs	900	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	17 secs	960	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	45 secs	700	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	39 secs	910	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	19 secs	870	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	58 secs	0	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	33 secs	780	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	20 secs	860	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	48 secs	600	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	17 secs	890	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	26 secs	820	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	48 secs	890	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	25 secs	830	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	48 secs	890	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	54 secs	0	Falso

No.	Question	Time Taken	Score	Response
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	62 secs	860	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	61 secs	790	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	145 secs	670	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	51 secs	830	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabético para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	18 secs	940	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	40 secs	860	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	54 secs	630	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	8 secs	920	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	18 secs	940	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	115 secs	610	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	21 secs	720	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **88%**

Student: Bryan Cisneros (Bryan Cisneros)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

46

✓ Correct

5

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	37 secs	750	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	46 secs	690	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	44 secs	710	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	55 secs	630	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	55 secs	630	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	64 secs	850	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	58 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	43 secs	0	disminuye el vaciamiento gástrico
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	31 secs	890	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	88 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	10 secs	930	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	35 secs	690	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	37 secs	670	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	49 secs	600	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	42 secs	860	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	54 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	23 secs	950	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	20 secs	860	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	42 secs	720	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	31 secs	790	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	11 secs	930	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	35 secs	770	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	13 secs	910	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	15 secs	900	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	8 secs	940	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	33 secs	780	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	21 secs	950	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	40 secs	910	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	46 secs	690	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	17 secs	960	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	23 secs	850	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊘
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	39 secs	740	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	20 secs	860	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	11 secs	900	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	11 secs	930	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	23 secs	840	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	15 secs	960	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	9 secs	940	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	12 secs	970	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	33 secs	780	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	14 secs	960	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	16 secs	940	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	61 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	12 secs	960	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	10 secs	960	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	9 secs	970	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	45 secs	700	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	33 secs	700	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	5 secs	980	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	47 secs	840	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	15 secs	810	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **86%**

Student: Anahi Reyna dareyna@espol.edu.ec (Anahi Reyna)
Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

45

✓ Correct

6

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	28 secs	810	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	35 secs	770	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	36 secs	760	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	21 secs	860	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	31 secs	790	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	37 secs	910	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	59 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	29 secs	810	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	33 secs	890	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	87 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	-	-	🕒
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	19 secs	830	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	13 secs	890	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	11 secs	910	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	31 secs	890	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	48 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	23 secs	940	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	45 secs	700	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	7 secs	950	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	21 secs	860	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	3 secs	980	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	20 secs	860	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	24 secs	840	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	15 secs	900	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	20 secs	860	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	27 secs	820	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	57 secs	870	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	29 secs	930	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	24 secs	840	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	24 secs	940	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	20 secs	860	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	53 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	42 secs	720	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	32 secs	790	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	18 secs	840	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	11 secs	920	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	13 secs	910	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	5 secs	990	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	18 secs	880	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	116 secs	740	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	48 secs	0	Falso
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	83 secs	810	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	67 secs	770	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	90 secs	800	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	31 secs	890	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	37 secs	870	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	33 secs	890	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	49 secs	670	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	20 secs	820	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	24 secs	920	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	90 secs	0	Pérdida de peso estimada >10%, atención nutricional y luego atención médico
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	15 secs	800	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

84%

Student: tamara gonzalez (Tamara González)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

44

✓ Correct

8

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	16 secs	890	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	59 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	58 secs	0	Espironolactona
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	46 secs	0	Identificación y eliminación de factores precipitantes
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	26 secs	820	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	31 secs	930	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	50 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	22 secs	850	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	24 secs	920	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	117 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	20 secs	870	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	21 secs	810	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	18 secs	840	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	35 secs	690	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	28 secs	900	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	59 secs	0	AINES como ibuprofeno

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	30 secs	930	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	27 secs	820	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	13 secs	910	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	13 secs	910	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	26 secs	830	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	16 secs	890	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	10 secs	930	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	8 secs	940	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	9 secs	940	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	12 secs	920	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	16 secs	960	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	11 secs	970	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	34 secs	770	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	2 secs	990	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	12 secs	920	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	62 secs	600	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	29 secs	800	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	14 secs	910	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	45 secs	600	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	16 secs	890	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	23 secs	840	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	6 secs	980	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	9 secs	940	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	101 secs	770	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	8 secs	940	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	36 secs	920	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	40 secs	860	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	124 secs	0	Se administran en embarazadas
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	37 secs	870	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	44 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	16 secs	940	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	50 secs	670	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	7 secs	940	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	66 secs	780	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	44 secs	850	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	8 secs	890	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

86%

Student: maite murillo (Nohelia Murillo)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

45

✓ Correct

7

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	16 secs	890	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	35 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	48 secs	0	Salbutamol
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	27 secs	820	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	22 secs	850	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	45 secs	900	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	51 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	47 secs	690	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	23 secs	920	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	119 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolíticoHay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	14 secs	0	Verdadero
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	14 secs	870	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	17 secs	850	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	28 secs	750	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	17 secs	940	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	58 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	22 secs	950	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	42 secs	720	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	29 secs	810	✓ Se requiere antisecretores, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	21 secs	860	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	27 secs	820	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	18 secs	880	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	22 secs	850	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	15 secs	900	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	16 secs	890	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	12 secs	920	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	17 secs	960	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	18 secs	960	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	21 secs	860	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	44 secs	900	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	20 secs	870	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	55 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	31 secs	790	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	15 secs	900	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	43 secs	620	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	27 secs	820	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	16 secs	890	✓ Transplantado

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	23 secs	940	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	20 secs	860	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinab. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	101 secs	770	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	17 secs	880	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	32 secs	920	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	38 secs	870	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	140 secs	690	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	23 secs	920	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	98 secs	670	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	37 secs	870	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	41 secs	730	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	5 secs	960	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	63 secs	790	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	76 secs	740	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	18 secs	770	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

82%

Student: daniela layana (Daniela Quiroz)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

43

✓ Correct

8

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	21 secs	860	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	22 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	47 secs	0	Espironolactona
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	12 secs	0	Minimización de los riesgos
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	9 secs	940	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	14 secs	960	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	36 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	44 secs	710	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	12 secs	960	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	79 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	21 secs	860	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	6 secs	950	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	24 secs	790	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	14 secs	870	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	9 secs	970	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	45 secs	700	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	28 secs	930	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	35 secs	760	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	12 secs	920	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	11 secs	920	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	9 secs	940	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	8 secs	940	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	9 secs	940	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	8 secs	950	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	19 secs	870	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	33 secs	780	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	18 secs	960	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	7 secs	980	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	13 secs	910	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	45 secs	900	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	4 secs	970	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊖
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	33 secs	780	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	11 secs	930	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	20 secs	830	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	8 secs	940	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	12 secs	920	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	11 secs	970	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	10 secs	930	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	33 secs	0	A y D son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	14 secs	900	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	61 secs	860	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	56 secs	810	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	129 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	78 secs	740	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	41 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	7 secs	970	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	44 secs	710	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	4 secs	960	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	61 secs	790	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	57 secs	810	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	8 secs	890	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

90%

Student: agustina delgado (agustina delgado m)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

47

✓ Correct

4

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	6 secs	960	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	49 secs	670	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	51 secs	660	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	8 secs	940	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	38 secs	750	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	46 secs	890	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	50 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	37 secs	750	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	7 secs	970	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	119 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	26 secs	820	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	17 secs	850	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	24 secs	790	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	34 secs	700	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	19 secs	930	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	58 secs	610	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	41 secs	900	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	25 secs	830	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	8 secs	950	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	6 secs	960	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	11 secs	930	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	41 secs	720	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	16 secs	890	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	17 secs	880	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	43 secs	710	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	24 secs	840	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	75 secs	830	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	21 secs	950	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	51 secs	660	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	8 secs	980	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	48 secs	680	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊘
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	36 secs	760	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	24 secs	840	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	41 secs	640	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	31 secs	790	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	29 secs	800	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	22 secs	950	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	35 secs	770	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	63 secs	860	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	27 secs	820	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	58 secs	870	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	51 secs	830	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	95 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	82 secs	720	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	109 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	48 secs	840	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	55 secs	630	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	37 secs	670	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	107 secs	640	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	115 secs	610	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	27 secs	640	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

86%

Student: Ariana Alvarez (Ariana Alvarez)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

45

✓ Correct

4

✗ Incorrect

4

⊖ Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	-	-	⊖
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	-	-	⊖
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	18 secs	880	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiaritmicos:	17 secs	890	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	39 secs	740	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	94 secs	790	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	52 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretinico se refiere a	24 secs	840	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	22 secs	920	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiaritmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	118 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaSe recomienda el consumo de sal light en estos pacientes
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	31 secs	790	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	28 secs	750	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	35 secs	690	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	38 secs	660	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	51 secs	830	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	55 secs	630	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	29 secs	930	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Una característica de un analgésico narcótico es:	34 secs	770	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	20 secs	870	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	17 secs	880	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	23 secs	850	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	22 secs	850	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	26 secs	830	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	16 secs	890	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	21 secs	860	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	24 secs	840	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	54 secs	880	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	25 secs	940	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	40 secs	730	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	14 secs	970	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	18 secs	880	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) está indicado en:	62 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	43 secs	710	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	18 secs	880	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	24 secs	780	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	12 secs	920	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	17 secs	890	✓ Transplantado

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	22 secs	950	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	19 secs	870	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	84 secs	810	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	55 secs	630	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	72 secs	840	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	23 secs	920	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	146 secs	670	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	19 secs	930	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	14 secs	950	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	17 secs	940	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	-	-	⊘
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	19 secs	830	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	14 secs	950	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	85 secs	0	Pérdida de peso >15%, atención especialista y terapia farmacológica
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	17 secs	770	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **76%**

Student: Maria Lopez (María José Lopez Merino)
Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

40

✓ Correct

12

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	9 secs	940	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	29 secs	800	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	29 secs	800	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	9 secs	940	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	5 secs	970	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	8 secs	980	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	29 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	5 secs	960	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	16 secs	940	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	49 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	49 secs	670	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	3 secs	980	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	7 secs	940	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	4 secs	970	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	6 secs	980	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	42 secs	0	AINES como ibuprofeno
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	8 secs	980	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	5 secs	970	✓ Todas las anteriores

No.	Question	Time Taken	Score	Response
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	4 secs	970	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	4 secs	970	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	2 secs	980	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	4 secs	970	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	3 secs	980	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	21 secs	860	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	5 secs	970	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	5 secs	960	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	6 secs	980	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	5 secs	980	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	6 secs	960	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	4 secs	990	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	2 secs	980	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	43 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	5 secs	0	Inhibidores de proteasas
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	7 secs	950	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	6 secs	0	Enfuvirtida
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	4 secs	970	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	4 secs	970	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	5 secs	990	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	3 secs	980	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	33 secs	920	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	21 secs	0	Falso

No.	Question	Time Taken	Score	Response
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	33 secs	920	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	9 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	44 secs	0	Son más potentes
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	35 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	13 secs	0	Terapia combinada Metformina, GLP1
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	4 secs	980	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	28 secs	0	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	3 secs	970	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	36 secs	880	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	64 secs	780	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	7 secs	910	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

84%

Student: Michelle Sarmiento (Michelle Sarmiento)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

44

✓ Correct

8

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	34 secs	770	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	56 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	53 secs	640	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiaritmicos:	41 secs	720	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	17 secs	890	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	41 secs	900	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	40 secs	0	inhibidor de dispetitilpeptidasa 4
8	Efecto Incretinico se refiere a	58 secs	610	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	22 secs	920	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiaritmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	117 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológica Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	31 secs	790	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	22 secs	810	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	18 secs	840	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	19 secs	830	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	18 secs	940	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	59 secs	610	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	20 secs	950	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	14 secs	910	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	36 secs	760	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	4 secs	970	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	27 secs	820	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	22 secs	850	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	12 secs	920	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	10 secs	930	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	28 secs	810	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	5 secs	960	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	15 secs	960	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	15 secs	960	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	29 secs	810	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	13 secs	970	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	7 secs	950	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	58 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	29 secs	810	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	12 secs	920	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	24 secs	780	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	12 secs	920	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	12 secs	920	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	17 secs	960	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	8 secs	940	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	121 secs	730	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	29 secs	800	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	51 secs	880	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	11 secs	960	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	98 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	87 secs	710	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	87 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	16 secs	940	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	47 secs	0	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	9 secs	920	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	55 secs	0	Metformina
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	113 secs	620	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	5 secs	930	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

88%

Student: Verónica Granda López

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

46

✓ Correct

6

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	40 secs	730	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	47 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	55 secs	0	Espironolactona
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	46 secs	690	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	48 secs	680	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	122 secs	730	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	54 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	30 secs	800	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	34 secs	880	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	111 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	25 secs	830	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	22 secs	800	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	25 secs	780	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	31 secs	720	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	30 secs	900	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	58 secs	0	AINES como ibuprofeno

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	71 secs	840	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	36 secs	760	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	36 secs	760	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	21 secs	860	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	29 secs	800	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	25 secs	830	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	20 secs	870	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	16 secs	890	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	14 secs	910	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	24 secs	840	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	25 secs	940	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	29 secs	930	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	45 secs	700	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	34 secs	920	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	26 secs	820	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	58 secs	0	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	25 secs	830	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	20 secs	860	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	28 secs	750	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	43 secs	710	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	30 secs	800	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	21 secs	950	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	14 secs	900	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	67 secs	850	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	30 secs	800	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	70 secs	840	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	17 secs	940	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	158 secs	650	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	67 secs	770	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	106 secs	640	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	24 secs	920	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	45 secs	700	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	24 secs	790	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	65 secs	780	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	63 secs	790	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	21 secs	720	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **88%**

Student: RAUL CAMACHO (RAUL CAMACHO)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

46

✓ Correct

5

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	40 secs	730	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	45 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	44 secs	0	Salbutamol
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	39 secs	740	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	13 secs	910	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	13 secs	970	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	43 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	36 secs	760	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	10 secs	960	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	17 secs	880	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	21 secs	810	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	21 secs	820	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	15 secs	870	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	84 secs	720	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	50 secs	670	✓ amitriptilina
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	116 secs	740	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	37 secs	750	✓ Todas las anteriores

No.	Question	Time Taken	Score	Response
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	23 secs	840	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	52 secs	650	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	11 secs	920	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	33 secs	780	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	6 secs	960	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	27 secs	820	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	25 secs	830	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	47 secs	690	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	29 secs	930	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	34 secs	920	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	28 secs	810	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	83 secs	810	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	24 secs	840	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	63 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	47 secs	690	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	11 secs	920	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	47 secs	600	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	19 secs	870	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	13 secs	910	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	20 secs	950	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	10 secs	930	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Inhibidores DPP4d. Análogo GLP-1	44 secs	900	✓ Sólo A es correcta

No.	Question	Time Taken	Score	Response
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	36 secs	760	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	101 secs	770	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	84 secs	720	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	160 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	117 secs	610	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes perdítricos</u> con A1C > 8.5%	113 secs	620	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	16 secs	940	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	47 secs	680	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	8 secs	930	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	111 secs	630	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	97 secs	670	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	9 secs	880	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **88%**

Student: Maite Santos

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

46

✓ Correct

6

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	20 secs	870	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	56 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	35 secs	770	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	40 secs	730	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	36 secs	760	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	53 secs	880	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	58 secs	0	inhibidor de dispetitilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	43 secs	710	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	37 secs	870	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	113 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	33 secs	780	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	27 secs	760	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	17 secs	850	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	26 secs	760	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	37 secs	870	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	58 secs	610	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	38 secs	910	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	30 secs	800	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	29 secs	810	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	48 secs	680	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	12 secs	920	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	30 secs	800	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	25 secs	830	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	26 secs	820	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	27 secs	820	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	36 secs	760	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	57 secs	870	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	53 secs	880	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	43 secs	710	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	50 secs	880	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	21 secs	860	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	63 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	45 secs	700	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	40 secs	730	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	28 secs	750	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	39 secs	740	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	29 secs	810	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	35 secs	920	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	35 secs	760	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	88 secs	800	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	54 secs	640	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	86 secs	800	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	41 secs	860	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	142 secs	680	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	65 secs	780	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	48 secs	840	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	58 secs	800	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	62 secs	0	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	20 secs	820	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	26 secs	910	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	103 secs	0	Pérdida de peso estimada >10%, atención nutricional y luego atención médico
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	14 secs	810	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **86%**

Student: Juan Crespin (Juan Echeverria Crespin) Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

45

✓ Correct

6

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	21 secs	860	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	16 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	41 secs	0	Salbutamol
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	44 secs	700	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	13 secs	910	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	16 secs	960	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	46 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	34 secs	770	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	13 secs	950	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	93 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	17 secs	890	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	11 secs	900	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	22 secs	810	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	21 secs	810	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	24 secs	920	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	50 secs	660	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	40 secs	910	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	39 secs	740	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	19 secs	870	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	22 secs	850	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	16 secs	890	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	37 secs	750	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	19 secs	870	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	15 secs	900	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	40 secs	730	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	48 secs	680	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	35 secs	920	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	26 secs	940	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	50 secs	660	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	47 secs	890	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	39 secs	740	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊘
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	43 secs	710	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	20 secs	860	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	35 secs	680	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	15 secs	0	Síndrome Nefrítico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	20 secs	870	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	25 secs	940	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	15 secs	900	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	72 secs	840	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	34 secs	770	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	93 secs	790	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	71 secs	760	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	114 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	96 secs	680	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	109 secs	630	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	35 secs	880	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	48 secs	680	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	27 secs	760	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	116 secs	610	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	96 secs	680	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	20 secs	740	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

86%

Student: Mónica Cantos

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

45

✓ Correct

3

✗ Incorrect

5

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	35 secs	760	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	48 secs	680	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	51 secs	660	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	9 secs	940	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	18 secs	880	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	24 secs	940	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	52 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretinico se refiere a	-	-	🕒
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	-	-	🕒
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	-	-	🕒
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	40 secs	650	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	30 secs	730	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	34 secs	700	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	14 secs	950	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	57 secs	620	✓ amitriptilina
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	47 secs	890	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	24 secs	840	✓ Todas las anteriores

No.	Question	Time Taken	Score	Response
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	7 secs	950	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	20 secs	860	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	15 secs	900	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	47 secs	680	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	9 secs	940	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	23 secs	850	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	43 secs	710	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	25 secs	830	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	78 secs	820	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	38 secs	910	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	38 secs	740	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	8 secs	980	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	47 secs	680	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) está indicado en:	62 secs	600	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	36 secs	760	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	25 secs	830	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	38 secs	660	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	20 secs	860	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	24 secs	840	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	20 secs	950	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	25 secs	830	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Inhibidores DPP4d. Análogo GLP-1	63 secs	860	✓ Sólo A es correcta

No.	Question	Time Taken	Score	Response
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	18 secs	880	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	55 secs	870	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	114 secs	620	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	64 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	76 secs	740	✓ Impiden reabsorción de iones Na ⁺ , Cl ⁻
46	Tratamiento antidiabético para <u>pacientes perdídricos</u> con A1C > 8.5%	112 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	11 secs	960	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	56 secs	630	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	18 secs	840	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	94 secs	680	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m ² con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	114 secs	620	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	28 secs	630	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

84%

Student: Mirka Constantine

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

44

✓ Correct

7

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	24 secs	840	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	56 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	60 secs	0	Salbutamol
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	30 secs	0	Identificación y eliminación de factores precipitantes
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	30 secs	800	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	42 secs	900	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	25 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	31 secs	790	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	15 secs	950	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	122 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	29 secs	810	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	9 secs	920	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	25 secs	780	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	34 secs	700	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	39 secs	870	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	-	-	🕒

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	80 secs	820	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	62 secs	600	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	11 secs	930	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	26 secs	830	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	6 secs	960	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	16 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	20 secs	860	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	15 secs	900	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	14 secs	900	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	24 secs	840	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	61 secs	860	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	77 secs	830	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	37 secs	750	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	96 secs	780	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	35 secs	770	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	60 secs	600	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	39 secs	740	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	25 secs	830	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	47 secs	0	Enfuvirtida
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	38 secs	750	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	40 secs	730	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	41 secs	900	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	24 secs	840	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	46 secs	890	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	63 secs	600	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	83 secs	810	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	59 secs	800	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	71 secs	840	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	67 secs	770	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	26 secs	910	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	103 secs	650	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	55 secs	630	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	5 secs	950	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	34 secs	880	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	60 secs	800	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	24 secs	680	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

80%

Student: Danyely Shirly Salinas Díaz (Danyely Shirly Salinas D)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

42

✓ Correct

9

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	18 secs	880	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	41 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	51 secs	0	Metformina
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	28 secs	810	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	21 secs	860	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	36 secs	920	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	34 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	28 secs	810	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	30 secs	900	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	117 secs	610	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	12 secs	920	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	15 secs	870	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	13 secs	880	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	16 secs	860	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	12 secs	960	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	-	-	🕒

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	21 secs	950	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	24 secs	840	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	18 secs	880	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	22 secs	850	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	21 secs	860	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	13 secs	910	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	6 secs	960	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	13 secs	910	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	8 secs	950	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	16 secs	890	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	24 secs	940	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	30 secs	930	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	25 secs	830	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	21 secs	950	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	17 secs	880	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	53 secs	650	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	39 secs	740	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	15 secs	900	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	35 secs	690	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	24 secs	840	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	27 secs	820	✓ Transplantado

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	14 secs	960	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	16 secs	890	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	101 secs	0	A y B son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	61 secs	600	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	83 secs	810	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	90 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	132 secs	0	Son más potentes
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	110 secs	0	Incrementan el volumen de orina eliminado
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	100 secs	660	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	13 secs	950	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	55 secs	0	Efecto analgésico protector gástrico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	24 secs	790	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	105 secs	0	Metformina
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	100 secs	660	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	30 secs	610	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

76%

Student: Luis Copo (Luis Alfredo Copo)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

40

✓ Correct

12

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	33 secs	780	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	14 secs	910	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	15 secs	900	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiaritmicos:	12 secs	920	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	52 secs	650	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucoemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	15 secs	960	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	51 secs	0	inhibidor de dispetitilpeptidasa 4
8	Efecto Incretinico se refiere a	24 secs	840	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	14 secs	950	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiaritmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	103 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	13 secs	910	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	18 secs	840	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	5 secs	950	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	5 secs	960	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	8 secs	970	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	54 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	33 secs	920	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	29 secs	810	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	15 secs	900	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	7 secs	950	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	18 secs	880	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	47 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	17 secs	880	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	18 secs	880	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	22 secs	850	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	19 secs	870	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	26 secs	0	Ezetimiba
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	99 secs	0	Ácido acetilsalicílico
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	33 secs	0	Manejo de la Hiperlipidemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	16 secs	960	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	28 secs	810	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	38 secs	0	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	20 secs	860	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	18 secs	880	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	18 secs	840	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	22 secs	850	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	48 secs	0	Dialisis peritoneal
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	24 secs	940	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	25 secs	830	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	21 secs	950	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	44 secs	710	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	23 secs	950	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	27 secs	910	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	122 secs	0	Son más potentes
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	25 secs	910	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	28 secs	900	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	12 secs	960	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	63 secs	0	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	9 secs	920	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	11 secs	960	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	110 secs	0	Pérdida de peso estimada >10%, atención nutricional y luego atención médico
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	28 secs	630	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **80%**

Student: Carlos Aguilar G (Carlos Aguilar Gaibor) Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

42

✓ Correct

9

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	26 secs	830	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	62 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	56 secs	620	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	50 secs	660	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	31 secs	790	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	48 secs	890	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	43 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	28 secs	810	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	16 secs	940	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	120 secs	600	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	26 secs	830	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	7 secs	940	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	29 secs	740	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	45 secs	600	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	38 secs	870	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	59 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	123 secs	720	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	59 secs	0	Es un derivado opiáceo.
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	8 secs	950	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	8 secs	940	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	7 secs	950	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	24 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	18 secs	880	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	15 secs	900	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	21 secs	860	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	42 secs	0	La función neuromuscular
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	38 secs	910	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	45 secs	900	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	49 secs	670	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	57 secs	870	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	15 secs	900	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊘
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	28 secs	810	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	22 secs	850	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	45 secs	600	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	36 secs	760	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	48 secs	680	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	35 secs	920	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	19 secs	870	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	54 secs	880	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	43 secs	710	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	84 secs	810	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	47 secs	840	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	39 secs	910	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	61 secs	790	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	36 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	100 secs	0	Nodulo Auriculo ventricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	54 secs	0	Efecto analgésico protector gástrico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	34 secs	700	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	37 secs	870	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	43 secs	850	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	24 secs	690	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

80%

Student: Emily Ortiz (Emily Ortiz Merchan)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

42

✓ Correct

5

✗ Incorrect

6

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	27 secs	820	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	61 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	61 secs	0	Espironolactona
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	42 secs	720	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	31 secs	790	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	42 secs	900	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	46 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	30 secs	800	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	33 secs	890	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	35 secs	760	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	19 secs	830	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	26 secs	770	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	32 secs	720	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	40 secs	860	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	57 secs	0	AINES como paracetamol
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	74 secs	830	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	-	-	🕒

No.	Question	Time Taken	Score	Response
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	18 secs	880	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	24 secs	840	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	5 secs	960	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	20 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	22 secs	850	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	14 secs	900	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	13 secs	910	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	27 secs	820	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	81 secs	820	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	41 secs	900	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	-	-	⊗
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	55 secs	870	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	22 secs	850	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊗
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	33 secs	780	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	18 secs	880	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	-	-	⊗
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	40 secs	730	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	41 secs	730	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	49 secs	890	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	22 secs	850	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	57 secs	870	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	60 secs	600	✓ Verdadero

No.	Question	Time Taken	Score	Response
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	82 secs	810	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	54 secs	820	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	93 secs	790	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	68 secs	770	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	78 secs	740	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	116 secs	610	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	54 secs	640	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	9 secs	920	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	32 secs	890	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	77 secs	740	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	23 secs	700	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

Student: Noelia Vega (Noelia Vega Falcones)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

75%
Accuracy % (correct / total)

52

Total Questions

39

✓ Correct

13

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	4 secs	970	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	43 secs	710	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	31 secs	0	Salbutamol
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	34 secs	0	Establecimiento de los objetivos de la terapéutica
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	18 secs	880	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	19 secs	950	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	27 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	45 secs	700	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	9 secs	970	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	56 secs	810	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	40 secs	0	Verdadero
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	39 secs	0	Falso
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	35 secs	690	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	22 secs	810	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	34 secs	880	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	44 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	39 secs	910	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	9 secs	940	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	23 secs	840	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	7 secs	950	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	29 secs	810	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	14 secs	900	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	14 secs	900	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	13 secs	910	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	40 secs	0	Verdadero
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	28 secs	810	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	49 secs	890	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	10 secs	970	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	20 secs	860	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	52 secs	880	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	24 secs	840	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	51 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	19 secs	870	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	30 secs	800	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	29 secs	740	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	9 secs	940	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	16 secs	890	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	7 secs	980	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	17 secs	880	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	36 secs	920	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	11 secs	920	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	102 secs	770	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	48 secs	0	Antiinflamatorio y antipirético
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	52 secs	880	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	30 secs	0	Incrementan el volumen de orina eliminado
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	38 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	72 secs	760	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	34 secs	770	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	7 secs	930	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	50 secs	0	Metformina
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	66 secs	0	Pérdida de peso estimada >10%, atención nutricional y luego atención médico
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	8 secs	900	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **80%**

Student: Sthefany Guzhñay

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

42

✓ Correct

7

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	25 secs	830	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	-	-	🕒
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	54 secs	0	Salbutamol
4	Son principios del uso clínico de antiaritmicos:	39 secs	0	Identificación y eliminación de factores precipitantes
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	28 secs	810	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	41 secs	910	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	51 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretinico se refiere a	33 secs	780	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	41 secs	860	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	17 secs	890	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	21 secs	810	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	32 secs	720	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	31 secs	720	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	29 secs	900	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	61 secs	0	AINES como paracetamol
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	79 secs	820	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide

No.	Question	Time Taken	Score	Response
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	-	-	⊘
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	14 secs	900	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	23 secs	840	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	4 secs	970	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	18 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	22 secs	850	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	12 secs	920	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	13 secs	910	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	42 secs	720	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	81 secs	820	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	40 secs	910	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	49 secs	670	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	47 secs	890	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	58 secs	610	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	61 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	23 secs	840	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	17 secs	880	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	47 secs	600	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	36 secs	760	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	41 secs	720	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	86 secs	800	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	48 secs	680	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	47 secs	890	✓ Sólo A es correcta

No.	Question	Time Taken	Score	Response
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	59 secs	610	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	126 secs	720	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	84 secs	720	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	76 secs	830	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	91 secs	690	✓ Impiden reabsorción de iones Na ⁺ , Cl ⁻
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes perdítricos</u> con A1C > 8.5%	56 secs	810	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	109 secs	0	Nodulo Auriculo ventricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	54 secs	640	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	31 secs	720	✓ Metformina
50	Fármaco anti-diabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	46 secs	840	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m ² con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	65 secs	780	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	24 secs	680	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

84%

Student: Daniela Real

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

44

✓ Correct

5

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	43 secs	710	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	57 secs	620	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	36 secs	760	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	47 secs	680	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	27 secs	820	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	26 secs	940	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	59 secs	0	inhibidor bomba sodio-potasio
8	Efecto Incretínico se refiere a	31 secs	790	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	31 secs	890	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	121 secs	600	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	24 secs	840	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	14 secs	880	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	18 secs	840	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	29 secs	740	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	86 secs	710	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	58 secs	0	AINES como ibuprofeno
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	-	-	🕒

No.	Question	Time Taken	Score	Response
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	-	-	<input type="radio"/>
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	51 secs	660	<input checked="" type="checkbox"/> Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	31 secs	790	<input checked="" type="checkbox"/> Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	24 secs	840	<input checked="" type="checkbox"/> Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	42 secs	720	<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	27 secs	820	<input checked="" type="checkbox"/> Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	27 secs	820	<input checked="" type="checkbox"/> Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	27 secs	820	<input checked="" type="checkbox"/> Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	35 secs	770	<input checked="" type="checkbox"/> La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	<input type="radio"/>
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	88 secs	800	<input checked="" type="checkbox"/> Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	42 secs	0	Manejo de la Hiperlipidemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	74 secs	830	<input checked="" type="checkbox"/> Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	28 secs	810	<input checked="" type="checkbox"/> Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	59 secs	0	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	46 secs	690	<input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	31 secs	790	<input checked="" type="checkbox"/> Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	37 secs	670	<input checked="" type="checkbox"/> Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	41 secs	720	<input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	39 secs	740	<input checked="" type="checkbox"/> Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	106 secs	760	<input checked="" type="checkbox"/> Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	40 secs	730	<input checked="" type="checkbox"/> 100%

No.	Question	Time Taken	Score	Response
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	90 secs	800	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	51 secs	660	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	107 secs	760	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	87 secs	710	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	148 secs	670	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	72 secs	760	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	105 secs	650	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	71 secs	760	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	56 secs	630	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	31 secs	720	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	82 secs	720	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	103 secs	650	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	23 secs	0	Sibutramina

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

Student: Tonny Andrade (Tony Andrade)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

76%
Accuracy % (correct / total)

52

Total Questions

40

✓ Correct

10

✗ Incorrect

3

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	47 secs	690	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	60 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	43 secs	710	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	38 secs	740	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	27 secs	820	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	72 secs	840	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	51 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	45 secs	700	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	59 secs	800	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	120 secs	0	Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolíticoSe recomienda el consumo de sal light en estos pacientesHay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	56 secs	620	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	35 secs	690	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	30 secs	730	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	33 secs	700	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	37 secs	870	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	58 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	35 secs	920	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	38 secs	740	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	52 secs	650	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibioticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	57 secs	620	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	16 secs	890	✓ Riñon
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	57 secs	0	Proteinas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	53 secs	640	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	31 secs	790	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	49 secs	670	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	46 secs	690	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊗
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	87 secs	0	Ácido acetilsalicílico
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	56 secs	620	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	48 secs	890	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	9 secs	940	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	57 secs	0	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistas
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	23 secs	0	Inhibidores de proteasas
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	51 secs	660	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	-	-	⊗
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	42 secs	720	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	47 secs	690	✓ Transplantado

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	34 secs	920	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	51 secs	660	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinab. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	74 secs	830	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	44 secs	710	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	125 secs	720	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	62 secs	790	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	162 secs	640	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	83 secs	720	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	34 secs	0	Metformina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	47 secs	840	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	56 secs	620	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	29 secs	740	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	27 secs	910	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	95 secs	0	Pérdida de peso estimada <10%, atención nutricional y luego atención médica
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	23 secs	700	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

Student: Gabriel Bermeo (Gabriel Bermeo)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

78%
Accuracy % (correct / total)

52

Total Questions

41

✓ Correct

9

✗ Incorrect

3

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	31 secs	790	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	60 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	57 secs	620	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	44 secs	710	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	61 secs	600	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	180 secs	600	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	61 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	59 secs	600	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	116 secs	610	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	🕒
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	59 secs	600	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	34 secs	700	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	45 secs	600	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	40 secs	640	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	29 secs	900	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	59 secs	0	OPIOIDE: codeína
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	62 secs	860	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	29 secs	800	✓ Todas las anteriores

No.	Question	Time Taken	Score	Response
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	54 secs	0	Se requiere un neutralizador del ácido
20	Efecto adverso de la metoclopramida	53 secs	640	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	48 secs	680	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	57 secs	620	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	55 secs	630	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	59 secs	600	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	59 secs	600	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	47 secs	680	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊗
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	22 secs	950	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	49 secs	670	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	17 secs	960	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	35 secs	760	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	50 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	20 secs	870	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	25 secs	830	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	40 secs	650	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	29 secs	810	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	25 secs	830	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	28 secs	930	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	11 secs	930	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	145 secs	0	B y C son correctas

No.	Question	Time Taken	Score	Response
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	59 secs	0	Falso
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	178 secs	0	Aumentan el aporte de oxígeno al miocardio
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	118 secs	0	Antiinflamatorio y antipirético
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	120 secs	730	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	71 secs	760	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	106 secs	640	✓ Metformina e insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	60 secs	800	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	58 secs	610	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	44 secs	610	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	119 secs	600	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	57 secs	810	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	25 secs	670	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

Student: Annie Mayorga (Annie Mayorga)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

65%
Accuracy % (correct / total)

52

Total Questions

34

✓ Correct

17

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	19 secs	870	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	46 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	51 secs	660	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	46 secs	0	Identificación y eliminación de factores precipitantes
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	30 secs	800	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	73 secs	830	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	39 secs	740	✓ inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal
8	Efecto Incretinico se refiere a	14 secs	910	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	14 secs	950	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	47 secs	0	Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Se recomienda el consumo de sal light en estos pacientes Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	22 secs	850	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	5 secs	960	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	22 secs	800	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	7 secs	940	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	19 secs	930	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	15 secs	0	AINES como ibuprofeno

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	36 secs	920	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	15 secs	900	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	9 secs	940	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibioticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	12 secs	920	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	5 secs	960	✓ Riñon
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	10 secs	930	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	12 secs	920	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	14 secs	0	Falso
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	51 secs	660	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	12 secs	920	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊗
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	97 secs	780	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	17 secs	890	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	56 secs	0	Rivaroxabán
31	La combinación Combivir contiene:	28 secs	0	Abacavir + Didanosina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	19 secs	0	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistas
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	47 secs	0	Inhibidores de integrasas
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	40 secs	730	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	14 secs	870	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	42 secs	0	Litiasis
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	30 secs	0	Hemodialisis

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	21 secs	0	Leve
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	29 secs	0	70%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinab. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	71 secs	840	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	16 secs	0	Falso
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	56 secs	0	Una disminución de las resistencias periféricas y, por tanto, de la tensión arterial
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	78 secs	740	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	94 secs	0	Se administran en embarazadas
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	93 secs	690	✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl-
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	23 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca:	13 secs	950	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	50 secs	660	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	5 secs	960	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	41 secs	860	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	35 secs	880	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	18 secs	760	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

65%

Student: Leandro Cabrera (Leandro Cabrera)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

34

✓ Correct

18

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	16 secs	890	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	24 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	42 secs	720	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	20 secs	870	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	14 secs	910	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	25 secs	0	Añado insulina cristalina
7	Saxagliptina es un fármaco..	37 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	25 secs	830	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	13 secs	950	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	97 secs	0	Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolíticoSe recomienda el consumo de sal light en estos pacientesHay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	43 secs	0	Verdadero
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	26 secs	770	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	43 secs	0	Ketoprofeno
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	44 secs	0	Síndrome de Cushing
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	119 secs	600	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	40 secs	730	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	63 secs	860	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	49 secs	670	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	6 secs	960	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibioticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	28 secs	810	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	27 secs	0	Médula Osea
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	40 secs	730	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	19 secs	870	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	29 secs	0	Falso
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	40 secs	730	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	22 secs	850	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	31 secs	930	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	48 secs	890	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	33 secs	780	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	49 secs	890	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	10 secs	930	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	49 secs	0	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	30 secs	800	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	38 secs	740	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	7 secs	930	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	20 secs	870	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	41 secs	0	Farmacologico

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	44 secs	900	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	42 secs	0	60%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinab. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	61 secs	860	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	51 secs	0	Falso
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	24 secs	940	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	37 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	32 secs	920	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	51 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	48 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	26 secs	910	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	56 secs	0	Efecto analgésico protector gástrico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	4 secs	960	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	31 secs	890	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	62 secs	0	Pérdida de peso >15%, atención especialista y terapia farmacológica
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	32 secs	600	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

67%

Student: Valery Guayas

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

35

✓ Correct

16

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	54 secs	0	Atenolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	22 secs	0	salbutamol
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	50 secs	0	Espironolactona
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	47 secs	0	Establecimiento de los objetivos de la terapéutica
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	37 secs	750	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	42 secs	900	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	47 secs	690	✓ inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal
8	Efecto Incretinico se refiere a	46 secs	0	mejora la secrecion de insulina
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	13 secs	950	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	81 secs	730	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	34 secs	770	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	25 secs	770	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	34 secs	690	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	40 secs	0	Síndrome de Cushing
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	78 secs	740	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	58 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	156 secs	0	Un paciente tomando 40 mg de prednisona diariamente durante 7 días para tratar una exacerbación del asma
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	36 secs	760	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	24 secs	840	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	40 secs	730	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	17 secs	890	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	58 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	19 secs	870	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	9 secs	940	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	16 secs	890	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	24 secs	840	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊘
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	39 secs	910	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	23 secs	840	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	93 secs	790	✓ Alteplasa
31	La combinación Combivir contiene:	34 secs	770	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	48 secs	0	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunistas
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	36 secs	760	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	34 secs	770	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	35 secs	690	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	32 secs	790	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	36 secs	760	✓ Transplantado

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	34 secs	920	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	43 secs	710	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	103 secs	0	A y B son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	49 secs	670	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	105 secs	760	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	83 secs	0	inflamatorio
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	128 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	104 secs	0	Aumentan la filtración glomerular
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	98 secs	0	Terapia combinada Metformina, GLP1
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca:	28 secs	900	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	54 secs	0	Efecto analgésico protector gástrico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	27 secs	760	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	67 secs	770	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	82 secs	720	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	21 secs	720	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **65%**

Student: wladimir alcivar briones (wladimir alcivar briones)
Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

34

✓ Correct

17

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	16 secs	890	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	54 secs	0	salbutamol
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	59 secs	600	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	20 secs	860	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	25 secs	830	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	23 secs	950	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	37 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretinico se refiere a	13 secs	910	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	16 secs	940	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	111 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaSe recomienda el consumo de sal light en estos pacientes
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	26 secs	830	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	7 secs	940	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	17 secs	850	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	20 secs	820	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	11 secs	960	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	62 secs	600	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	13 secs	970	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Una característica de un analgésico narcótico es:	60 secs	600	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	32 secs	780	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	21 secs	860	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	33 secs	780	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	49 secs	0	Proteínas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	11 secs	920	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	44 secs	710	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	41 secs	720	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	62 secs	600	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	32 secs	930	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	16 secs	960	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	-	-	⊘
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	139 secs	0	Rivaroxabán
31	La combinación Combivir contiene:	56 secs	630	✓ Zidovudina + Lamivudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) está indicado en:	60 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	40 secs	0	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	57 secs	620	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	46 secs	600	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	61 secs	0	Síndrome Nefrítico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día posttratamiento de:	26 secs	0	Dialisis peritoneal

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	41 secs	910	✓ Moderada
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	35 secs	0	60%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	26 secs	0	A y B son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	13 secs	910	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	160 secs	640	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	84 secs	0	Antiinflamatorio y antipirético
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	120 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	104 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	101 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	12 secs	960	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	58 secs	0	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	44 secs	600	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	73 secs	0	Metformina
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	28 secs	900	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	26 secs	660	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

53%

Student: Emily Sánchez (Emily Sánchez)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

28

✓ Correct

24

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	26 secs	830	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	30 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	12 secs	920	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	20 secs	860	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	21 secs	860	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	19 secs	0	Continuo con metformina
7	Saxagliptina es un fármaco..	13 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	44 secs	0	Efecto pleiotropico sistémico, mejorando la captación de glucosa,
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	34 secs	880	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	64 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	16 secs	890	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	19 secs	830	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	15 secs	0	Ketoprofeno
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	13 secs	0	Hipertensión
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	26 secs	0	Disminución de la producción de prostaglandinas
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	17 secs	0	OPIOIDE: codeína

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	9 secs	980	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	5 secs	960	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	33 secs	780	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	10 secs	0	Diarrea
21	Eritropoyetina se produce en:	6 secs	960	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	15 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	4 secs	970	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	6 secs	0	Falso
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	9 secs	0	Verdadero
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	13 secs	0	La función neuromuscular
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	25 secs	940	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	29 secs	0	Ácido acetilsalicílico
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	25 secs	830	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	13 secs	0	Rivaroxabán
31	La combinación Combivir contiene:	6 secs	960	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	21 secs	860	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	23 secs	0	Inhibidores de proteasas
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	8 secs	0	Mielosupresion
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	5 secs	960	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	15 secs	900	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	19 secs	870	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	21 secs	0	Leve
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	17 secs	890	✓ 100%

No.	Question	Time Taken	Score	Response
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	21 secs	950	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	16 secs	890	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	27 secs	940	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	10 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	25 secs	0	Son más potentes
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	8 secs	0	Aumentan la filtración glomerular
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	12 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	13 secs	0	Nodulo Auriculo ventricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	13 secs	910	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	4 secs	960	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	11 secs	960	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	45 secs	850	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	9 secs	880	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

59%

Student: Genesis Vite (Genesis Vite)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

31

✓ Correct

21

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	19 secs	870	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	41 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	48 secs	680	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiaritmicos:	11 secs	920	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	28 secs	810	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	139 secs	0	Continuo con metformina
7	Saxagliptina es un fármaco..	46 secs	0	inhibidor bomba sodio-potasio
8	Efecto Incretinico se refiere a	21 secs	860	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	29 secs	900	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiaritmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	82 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	15 secs	900	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	9 secs	920	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	22 secs	0	Paracetamol
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	35 secs	0	Síndrome de Cushing
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	26 secs	910	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	47 secs	0	AINES como ibuprofeno

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	115 secs	740	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	11 secs	930	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	51 secs	0	Se requiere un neutralizador del ácido
20	Efecto adverso de la metoclopramida	21 secs	0	Estreñimiento
21	Eritropoyetina se produce en:	42 secs	720	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	44 secs	0	Lípidos
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	22 secs	850	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	11 secs	0	Falso
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	16 secs	890	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	24 secs	0	La función neuromuscular
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	17 secs	0	Simvastatina
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	19 secs	950	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	51 secs	660	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	29 secs	0	Enoxaparina
31	La combinación Combivir contiene:	9 secs	940	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	50 secs	660	✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	54 secs	0	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	55 secs	630	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	11 secs	910	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	56 secs	620	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	56 secs	630	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	16 secs	960	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	42 secs	720	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	155 secs	0	A y D son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	56 secs	620	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	143 secs	680	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	87 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	107 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	112 secs	0	Aumentan la filtración glomerular
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	23 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	25 secs	910	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	58 secs	610	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	45 secs	0	Insulina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	13 secs	950	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	24 secs	920	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	20 secs	730	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

53%

Student: Orly Chavez

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

28

✓ Correct

23

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	47 secs	0	Atenolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	15 secs	900	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	57 secs	620	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	56 secs	620	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	53 secs	640	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	32 secs	930	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	20 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	46 secs	0	mejora la secrecion de insulina
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	13 secs	950	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	105 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	33 secs	780	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	20 secs	820	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	48 secs	600	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	28 secs	0	Síndrome de Cushing
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	108 secs	0	Aumento de la excreción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	53 secs	0	OPIOIDE: codeína

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	128 secs	710	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	28 secs	810	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	60 secs	600	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	16 secs	0	Diarrea
21	Eritropoyetina se produce en:	22 secs	0	Médula Osea
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	52 secs	0	Proteínas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	25 secs	830	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	32 secs	790	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	41 secs	720	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	45 secs	700	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊗
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	88 secs	800	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	44 secs	700	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	142 secs	0	Enoxaparina
31	La combinación Combivir contiene:	19 secs	870	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	52 secs	0	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	62 secs	0	Inhibidores de proteasas
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	52 secs	0	Reaccion exantemica
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	47 secs	0	Dolutegravir
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	23 secs	0	Sindrome Nefrítico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	48 secs	680	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	71 secs	0	Leve

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	50 secs	0	60%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	123 secs	720	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	55 secs	630	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	56 secs	0	Una disminución de las resistencias periféricas y, por tanto, de la tensión arterial
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	108 secs	640	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	115 secs	0	Son más potentes
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	104 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	112 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	84 secs	720	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	63 secs	0	Efecto analgésico protector gástrico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	5 secs	950	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	88 secs	700	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	93 secs	690	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	18 secs	760	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

51%

Student: Eduardo Dueñas M

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

27

✓ Correct

25

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	28 secs	0	Atenolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	53 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	56 secs	630	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	35 secs	770	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	43 secs	0	Falso
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	30 secs	930	✓ Añado insulina NPH
7	Saxagliptina es un fármaco..	24 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	34 secs	0	Efecto pleiotropico sistémico, mejorando la captación de glucosa,
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	45 secs	850	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	79 secs	730	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	49 secs	670	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	34 secs	700	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	48 secs	0	Diclofenaco
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	36 secs	0	Síndrome de Cushing
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	106 secs	0	Estimulación del eje hipotálamico-hipófisis-adrenal
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	60 secs	0	OPIOIDE: codeína

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	73 secs	0	Un paciente tomando 40 mg de prednisona diariamente durante 7 días para tratar una exacerbación del asma
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	22 secs	850	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	54 secs	640	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	58 secs	610	✓ Temblores
21	Eritropoyetina se produce en:	21 secs	860	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	56 secs	0	Proteínas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina	19 secs	870	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	7 secs	0	Falso
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	58 secs	610	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	29 secs	810	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	72 secs	0	Ezetimiba
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	88 secs	0	Warfarina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	34 secs	770	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	57 secs	0	Enoxaparina
31	La combinación Combivir contiene:	19 secs	870	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	41 secs	0	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	47 secs	0	Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos
34	Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI	41 secs	720	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	9 secs	920	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	20 secs	0	Litiasis
37	De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	17 secs	890	✓ Transplantado

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	33 secs	0	Leve
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	31 secs	0	70%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	127 secs	0	A y D son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	29 secs	810	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	123 secs	720	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	60 secs	800	✓ inmunosupresión
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	172 secs	610	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	40 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	99 secs	0	Terapia combinada Metformina, GLP1
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca:	80 secs	0	Haz de Hiz
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	52 secs	650	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	20 secs	820	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	90 secs	0	TZD
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	23 secs	920	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	19 secs	740	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

51%

Student: Oscar Erazo

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

27

✓ Correct

22

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	35 secs	760	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	59 secs	0	salbutamol
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	60 secs	600	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	40 secs	730	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	61 secs	0	Falso
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	69 secs	0	Continuo con metformina
7	Saxagliptina es un fármaco..	60 secs	600	✓ inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal
8	Efecto Incretinico se refiere a	56 secs	0	mejora la secrecion de insulina
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	17 secs	940	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	71 secs	760	✓ Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	36 secs	760	✓ Falso
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	23 secs	800	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	40 secs	650	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	-	-	🕒
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	46 secs	0	Aumento de la excreción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	56 secs	0	OPIOIDE: codeína

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	134 secs	0	Un paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente durante 6 meses para la rinitis alérgica
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	42 secs	720	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	54 secs	640	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibióticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	56 secs	0	Diarrea
21	Eritropoyetina se produce en:	25 secs	0	Todas
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	40 secs	730	✓ Ninguno
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	10 secs	930	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	38 secs	750	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	52 secs	0	Verdadero
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	50 secs	670	✓ La conducción y función cardiaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	89 secs	800	✓ Clofibrato
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	100 secs	770	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	48 secs	0	Manejo de la Hiperlipidemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	106 secs	0	Enoxaparina
31	La combinación Combivir contiene:	14 secs	910	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	59 secs	0	Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	-	-	⊖
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	29 secs	0	Mielosupresion
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	9 secs	920	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	49 secs	670	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	17 secs	0	Hemodialisis
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	22 secs	0	Leve

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	50 secs	660	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	154 secs	0	A y D son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	9 secs	940	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	97 secs	780	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	63 secs	0	Antiinflamatorio y antipirético
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	166 secs	0	Son más potentes
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	42 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	89 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	82 secs	720	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	41 secs	720	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	9 secs	920	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	96 secs	0	Metformina
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	80 secs	730	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	-	-	⊘

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

46%

Student: Harold Soledispa (Harold Soledispa)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

24

✓ Correct

28

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	47 secs	0	Carbedilol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	59 secs	610	✓ metildopa
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	45 secs	700	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	52 secs	650	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	47 secs	680	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	106 secs	0	Continuo con metformina
7	Saxagliptina es un fármaco..	39 secs	740	✓ inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal
8	Efecto Incretinico se refiere a	58 secs	610	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	10 secs	0	Resistencia periférica a la insulina
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	110 secs	0	Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico. Se recomienda el consumo de sal light en estos pacientes. Hay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	62 secs	0	Verdadero
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	29 secs	740	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	45 secs	0	Diclofenaco
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	43 secs	0	Síndrome de Cushing
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	96 secs	680	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	28 secs	810	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	126 secs	0	Un paciente que recibe una inyección intraarticular de metilprednisolona para osteoartritis.
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	57 secs	620	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	53 secs	650	✓ Se requiere antisecretor, con dos antibioticos
20	Efecto adverso de la metoclopramida	35 secs	0	Diarrea
21	Eritropoyetina se produce en:	10 secs	0	Médula Osea
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	58 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	43 secs	710	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	59 secs	0	Falso
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	37 secs	0	Verdadero
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	50 secs	0	La función neuromuscular
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	20 secs	0	Simvastatina
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	79 secs	820	✓ Enoxaparina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	48 secs	680	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	118 secs	0	Ticagrelor
31	La combinación Combivir contiene:	42 secs	720	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	55 secs	0	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistas
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	62 secs	600	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	49 secs	670	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	45 secs	0	Amprenavir
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	62 secs	600	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	41 secs	0	Farmacologico

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	20 secs	0	Leve
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	14 secs	0	60%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinab. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	35 secs	920	✓ Sólo A es correcta
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	17 secs	0	Falso
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	99 secs	780	✓ Disminución de las necesidades de oxígeno al miocardio al disminuir el gasto cardíaco, frecuencia y contractilidad cardíaca.
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	80 secs	0	inflamatorio
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	164 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	16 secs	0	Incrementan el volumen de orina eliminado
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	8 secs	0	Metformina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	22 secs	920	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	33 secs	0	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	8 secs	930	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	95 secs	680	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	52 secs	0	Pérdida de peso estimada <10%, atención nutricional y luego atención médica
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	20 secs	740	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **46%**

Student: Genesis Escalante (Genesis Escalante)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

24

✓ Correct

28

✗ Incorrect

1

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	55 secs	630	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	56 secs	0	salbutamol
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	57 secs	620	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	57 secs	620	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	48 secs	680	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	112 secs	0	Añado insulina cristalina
7	Saxagliptina es un fármaco..	37 secs	0	inhibidor de dispetitilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	58 secs	610	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	87 secs	710	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	115 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológicaEs necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	59 secs	0	Verdadero
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	39 secs	650	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	47 secs	0	Paracetamol
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	46 secs	0	Hipertensión
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	112 secs	0	Estimulación del eje hipotalámico-hipófisis-adrenal
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	30 secs	800	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	102 secs	770	✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	46 secs	690	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	60 secs	0	Se requiere un neutralizador del ácido
20	Efecto adverso de la metoclopramida	63 secs	0	Diarrea
21	Eritropoyetina se produce en:	38 secs	740	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	49 secs	0	Proteínas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	55 secs	0	Falso
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	46 secs	690	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	52 secs	0	Verdadero
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	54 secs	640	✓ La conducción y función cardíaca
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	59 secs	0	Ezetimiba
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	118 secs	0	Warfarina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	38 secs	0	Manejo de la Hiperlipidemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	158 secs	0	Enoxaparina
31	La combinación Combivir contiene:	36 secs	760	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	61 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	58 secs	610	✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	58 secs	0	Reaccion exantemica
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	47 secs	600	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	58 secs	610	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	56 secs	620	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	88 secs	0	Leve

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	61 secs	0	60%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	48 secs	0	B y C son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	58 secs	0	Falso
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	133 secs	0	Una disminución de las resistencias periféricas y, por tanto, de la tensión arterial
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	81 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	44 secs	900	✓ Producen menos tos como efecto adverso
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	40 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8,5%	18 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	32 secs	0	Nodulo Auriculo ventricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	45 secs	700	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	37 secs	670	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	106 secs	640	✓ SGLT2 o GLP1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	81 secs	730	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	10 secs	860	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

40%

Student: Maria Jose Suarez

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

21

✓ Correct

30

✗ Incorrect

2

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	20 secs	860	✓ Propranolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	24 secs	0	enalapril
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	36 secs	760	✓ Enalapril
4	Son principios del uso clínico de antiaritmicos:	59 secs	0	Imaginar la lectrofisiología del corazón como un objetivo en movimiento
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	49 secs	670	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	25 secs	0	Continuo con metformina
7	Saxagliptina es un fármaco..	45 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretinico se refiere a	62 secs	0	mejora la secrecion de insulina
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	84 secs	720	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiaritmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	119 secs	0	Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolíticoSe recomienda el consumo de sal light en estos pacientesHay que observar el consumo, de preferencia disminuir o suspender, de verduras y vegetales verdes.
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	35 secs	0	Verdadero
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	30 secs	730	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	44 secs	0	Ketoprofeno
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	39 secs	650	✓ Enfermedad inflamatoria intestinal
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	53 secs	820	✓ Inhibición de la absorción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	49 secs	670	✓ amitriptilina

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	151 secs	0	Un paciente tomando 40 mg de prednisona diariamente durante 7 días para tratar una exacerbación del asma
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	24 secs	840	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	60 secs	0	Se requiere un neutralizador del ácido
20	Efecto adverso de la metoclopramida	53 secs	0	Hiperexcitabilidad
21	Eritropoyetina se produce en:	11 secs	920	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	50 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	50 secs	670	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	56 secs	630	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	52 secs	650	✓ Falso
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	58 secs	0	El equilibrio osmolar
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊖
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	55 secs	0	Ácido acetilsalicílico
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	40 secs	730	✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	93 secs	0	Rivaroxabán
31	La combinación Combivir contiene:	21 secs	860	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	46 secs	0	Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistas
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	30 secs	0	Inhibidores de proteasas
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	52 secs	0	Astenia-adinamia
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	43 secs	620	✓ Maraviroc
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	49 secs	0	Litiasis
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 dia postratamiento de:	50 secs	660	✓ Transplantado

No.	Question	Time Taken	Score	Response
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	59 secs	0	Leve
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	47 secs	0	70%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinab. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	128 secs	0	B y C son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	22 secs	0	Falso
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	46 secs	0	Aumentan el aporte de oxígeno al miocardio
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	62 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	74 secs	0	No producen Hiperpotasemia
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	65 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	103 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	20 secs	930	✓ Nodulo sinoauricular
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	55 secs	630	✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	16 secs	860	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	45 secs	0	Metformina
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	109 secs	0	Pérdida de peso estimada <10%, atención nutricional y luego atención médica
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	28 secs	630	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición **38%**

Student: Gardenia Garcia (Gardenia Garcia)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

20

✓ Correct

25

✗ Incorrect

8

🕒 Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	12 secs	0	Nevibolol
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	45 secs	0	propranolol
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	-	-	🕒
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	28 secs	810	✓ Todas las anteriores
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	46 secs	690	✓ Verdadero
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	118 secs	0	Continuo con metformina
7	Saxagliptina es un fármaco..	40 secs	0	inhibidor de dispetilpeptidasa 4
8	Efecto Incretínico se refiere a	52 secs	650	✓ Todas las anteriores
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	84 secs	720	✓ Falla de células beta pancreáticas
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	109 secs	0	Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológica Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico Se recomienda el consumo de sal light en estos pacientes
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	46 secs	0	Verdadero
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	30 secs	740	✓ Verdadero
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	35 secs	690	✓ Oxaprozina
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	-	-	🕒
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	87 secs	0	Aumento de la excreción de calcio
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	47 secs	0	AINES como paracetamol

No.	Question	Time Taken	Score	Response
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	132 secs	0	Un paciente tomando 40 mg de prednisona diariamente durante 7 días para tratar una exacerbación del asma
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	40 secs	730	✓ Todas las anteriores
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	49 secs	0	Es necesario tratamiento antiácido
20	Efecto adverso de la metoclopramida	43 secs	0	Diarrea
21	Eritropoyetina se produce en:	7 secs	950	✓ Riñón
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	49 secs	0	Todas
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	44 secs	700	✓ Verdadero
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	50 secs	660	✓ Verdadero
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	45 secs	0	Verdadero
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	46 secs	0	La función neuromuscular
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊗
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	131 secs	0	Warfarina
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	46 secs	0	Manejo de la Hiperlipidemia
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	-	-	⊗
31	La combinación Combivir contiene:	6 secs	960	✓ Zidovudina + Lamibudina
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	38 secs	0	Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	-	-	⊗
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	23 secs	850	✓ Disminución de las enzimas hepáticas
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	-	-	⊗
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	47 secs	680	✓ Síndrome Nefrótico
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	48 secs	680	✓ Transplantado
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	122 secs	720	✓ Moderada

No.	Question	Time Taken	Score	Response
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	14 secs	900	✓ 100%
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	133 secs	0	B y C son correctas
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	42 secs	720	✓ Verdadero
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	146 secs	0	Disminuir el espasmo coronario, aumento de flujo a través de la circulación
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	50 secs	0	todas las anteriores
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que:	-	-	⊗
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	99 secs	0	Aumentan la reabsorción de bicarbonatos
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	14 secs	0	Insulina
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca:	58 secs	0	Haz de Hiz
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	46 secs	0	Efecto analgésico protector gástrico
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	14 secs	870	✓ Metformina
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	95 secs	0	Metformina
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	72 secs	760	✓ Pérdida de peso estimada >10%, atención especialista e intervención nutricional
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	16 secs	780	✓ Orlistat

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición

0%

Student: Carolina C (Carolina C)

Accuracy % (correct / total)

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

52

Total Questions

0

✓ Correct

0

✗ Incorrect

53

⊖ Unattempted

Questions

No.	Question	Time Taken	Score	Response
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	-	-	⊖
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	-	-	⊖
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	-	-	⊖
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	-	-	⊖
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	-	-	⊖
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	-	-	⊖
7	Saxagliptina es un fármaco..	-	-	⊖
8	Efecto Incretinico se refiere a	-	-	⊖
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	-	-	⊖
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	-	-	⊖
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	-	-	⊖
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	-	-	⊖
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	-	-	⊖
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	-	-	⊖
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	-	-	⊖
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	-	-	⊖
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides?	-	-	⊖
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	-	-	⊖
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	-	-	⊖
20	Efecto adverso de la metoclopramida	-	-	⊖
21	Eritropoyetina se produce en:	-	-	⊖
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de:	-	-	⊖
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	-	-	⊖
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	-	-	⊖
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	-	-	⊖
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	-	-	⊖

No.	Question	Time Taken	Score	Response
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	-	-	⊗
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	-	-	⊗
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicación:	-	-	⊗
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	-	-	⊗
31	La combinación Combivir contiene:	-	-	⊗
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	-	-	⊗
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	-	-	⊗
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	-	-	⊗
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	-	-	⊗
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	-	-	⊗
37	De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	-	-	⊗
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad:	-	-	⊗
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al:	-	-	⊗
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable?a. Insulinasb. Metforminac. Ihibidores DPP4d. Análogo GLP-1	-	-	⊗
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	-	-	⊗
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	-	-	⊗
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	-	-	⊗
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	-	-	⊗
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	-	-	⊗
46	Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C > 8.5%	-	-	⊗
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca:	-	-	⊗
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	-	-	⊗
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	-	-	⊗
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	-	-	⊗
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	-	-	⊗
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	-	-	⊗

Quizizz

Examen Final de Farmacología y Nutrición

Date: Mon Sep 07 2020 - 11:01 am

80%

Accuracy %
(correct / total)

52

Number of Questions

55

Number of Players

Questions

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
1	Señale el betabloqueador no selectivo de primera generación	27 secs	● 85%	47	6	2
2	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	42 secs	● 34%	19	33	3
3	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	45 secs	● 70%	39	14	2
4	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	34 secs	● 81%	45	9	1
5	Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()	29 secs	● 94%	52	2	1
6	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	47 secs	● 81%	45	9	1
7	Saxagliptina es un fármaco..	43 secs	● 10%	6	48	1
8	Efecto Incretínico se refiere a	33 secs	● 83%	46	7	2
9	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	28 secs	● 94%	52	1	2
10	¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)	99 secs	● 25%	14	31	10
11	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	27 secs	● 81%	45	7	3
12	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	18 secs	● 96%	53	1	1
13	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	25 secs	● 83%	46	8	1
14	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	24 secs	● 80%	44	8	3

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
15	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	36 secs	● 87%	48	6	1
16	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	49 secs	● 43%	24	27	4
17	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	54 secs	● 85%	47	6	2
18	Un característica de un analgésico narcótico es:	31 secs	● 90%	50	1	4
19	Para el tratamiento ulceropéptico asociado por <i>H. pylori</i> señale la alternativa correcta	25 secs	● 89%	49	5	1
20	Efecto adverso de la metoclopramida	23 secs	● 83%	46	8	1
21	Eritropoyetina se produce en:	15 secs	● 90%	50	4	1
22	Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:	28 secs	● 65%	36	18	1
23	Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina	21 secs	● 94%	52	2	1
24	LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA	20 secs	● 87%	48	6	1
25	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	27 secs	● 85%	47	7	1
26	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	27 secs	● 87%	48	6	1
27	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	37 secs	● 69%	38	7	10
28	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	41 secs	● 81%	45	9	1
29	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	33 secs	● 85%	47	5	3
30	Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?	45 secs	● 78%	43	10	2
31	La combinación Combivir contiene:	19 secs	● 96%	53	1	1
32	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	53 secs	● 18%	10	35	10

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
33	Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento?	32 secs	70%	39	13	3
34	Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI	25 secs	89%	49	5	1
35	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	27 secs	85%	47	4	4
36	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	25 secs	87%	48	6	1
37	De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de:	28 secs	87%	48	6	1
38	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la preescrición del ejercicio ud la preescribiría a intensidad:	28 secs	83%	46	8	1
39	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	21 secs	83%	46	8	1
40	En personas con daño inminente en el páncreas, ¿Qué tratamiento es el mas recomendable? a. Insulinas b. Metformina c. Ihibidores DPP4 d. Análogo GLP-1	62 secs	74%	41	13	1
41	Es cierto indicar que la fase intestinal controla la velocidad de entrada del quimo al duodeno?	36 secs	80%	44	9	2
42	¿Los fármacos betabloqueantes deben su acción antihipertensiva a....?	68 secs	87%	48	6	1
43	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	57 secs	70%	39	15	1
44	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que:	98 secs	52%	29	24	2
45	¿Cuál NO es una característica de los diuréticos?	60 secs	69%	38	16	1
46	Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5%	59 secs	54%	30	24	1
47	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca:	34 secs	87%	48	6	1
48	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	45 secs	70%	39	14	2

No.	Question	Avg. Time	Accuracy	Correct	Incorrect	Unattempted
49	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	15 secs	● 96%	53	1	1
50	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso	51 secs	● 83%	46	8	1
51	Tratamiento para paciente con BMI 30-40 Kg/m2 con presencia de comorbilidades, señale la alternativa correcta	69 secs	● 78%	43	11	1
52	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	16 secs	● 94%	52	1	2

Andrea Manzano
 Plan: Básico

Actualiza a Super

+ Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

Live lesson

Examen Final de Farmacología y Nutrición Editar

September 7th 2020, 11:01 AM (7 hours ago)

Ver lección

Panel de datos


 52
Preguntas
 55
Participantes

Participantes

Preguntas

Resumen

Temas



Imprimir



Descargar

 Mostrando Mejor intento

 Ordenar por: Puntuación
 Enviar un correo electrónico a todos los padres

Sofía SalcaN (Sofía Sal... <i>1 intento</i>)	47	4	90% Precisión	44100 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Antonio Arellano (Anto... <i>1 intento</i>)	46	6	88% Precisión	43760 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Jefferson Vega (Jeffers... <i>1 intento</i>)	45	7	87% Precisión	42820 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Doménica Chang <i>1 intento</i>	47	5	90% Precisión	42770 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Anny Gonzalez (Anny ... <i>1 intento</i>)	48	4	92% Precisión	42690 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Yaritza Sampedro (Yari... <i>1 intento</i>)	50	2	96% Precisión	40580 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Cristhian Quijije (Crist... <i>1 intento</i>)	48	3	92% Precisión	40320 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Mildred Gordillo Varga... <i>1 intento</i>	49	3	94% Precisión	40090 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Ricardo Ortiz (Ricardo ... <i>1 intento</i>)	46	5	88% Precisión	40080 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Carolina C (Carolina CA... <i>2 intentos</i>)	47	3 2	90% Precisión	39900 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Domenica Poveda (Do... <i>1 intento</i>)	45	7	87% Precisión	39900 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Samantha Chavez (Sa... <i>1 intento</i>)	48	3	92% Precisión	39820 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Katherine Carrera (Kat... <i>1 intento</i>)	45	6	87% Precisión	39420 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Victoria Muñoz Yee (Vi... <i>1 intento</i>)	47	5	90% Precisión	39300 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Emilly Chiriguay (Emill... <i>1 intento</i>)	45	7	87% Precisión	38930 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Andrea Tenorio atenor... <i>1 intento</i>	47	4	90% Precisión	38820 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Priscila Zamora (Kearly... <i>1 intento</i>)	47	3 2	90% Precisión	38630 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Bryan Cisneros (Bryan ... <i>1 intento</i>)	46	5	88% Precisión	38550 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
Anahi Reyna dareyna... <i>1 intento</i>	45	6	87% Precisión	38300 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
tamara gonzalez (Tam... <i>1 intento</i>)	44	8	85% Precisión	38140 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
maite murillo (Nohelia ... <i>1 intento</i>)	45	7	87% Precisión	38030 Puntuación	<input checked="" type="checkbox"/> Correo electrónico a progenitor
daniela layana (Daniel... <i>1 intento</i>)	43	8	83% Precisión	37980 Puntuación	
agustina delgado (agus... <i>1 intento</i>)					

Andrea Manzano
Plan: Básico

[Actualiza a Super](#)

[+ Crear](#)

- Explorar
- Mi biblioteca
- Informes
- Clases
- Ajustes
- Más

Buscar		Informes		Lecciones <small>nuevo</small>	9+ <small>Enter Code</small>
		Precisión	Puntuación		
<i>1 intento</i>					
Maria Lopez (María Jos...)	40	12	77% Precisión	37590 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Michelle Sarmiento (Mi...)	44	8	85% Precisión	37540 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Verónica Granda López	46	6	88% Precisión	37200 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
RAUL CAMACHO (RAUL...)	46	5	88% Precisión	37110 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Maite Santos	46	6	88% Precisión	36720 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Juan Crespin (Juan Ech...)	45	6	87% Precisión	36260 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Mónica Cantos	45	3 4	87% Precisión	35750 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Mirka Constantine	44	7	85% Precisión	35590 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Danyely Shirly Salinas...	42	9	81% Precisión	35380 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Luis Copo (Luis Alfredo...)	40	12	77% Precisión	35250 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Carlos Aguilar G (Carlo...)	42	9	81% Precisión	34110 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Emily Ortiz (Emily Ortiz...)	42	5 5	81% Precisión	34050 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Noelia Vega (Noelia Ve...)	39	13	75% Precisión	33730 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Sthefany Guzhñay	42	7 3	81% Precisión	33270 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Daniela Real	44	5 3	85% Precisión	33090 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Tonny Andrade (Tony ...)	40	10 2	77% Precisión	29840 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Gabriel Bermeo (Gabri...)	41	9 2	79% Precisión	29500 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Annie Mayorga (Annie ...)	34	17	65% Precisión	28920 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Leandro Cabrera (Lean...)	34	18	65% Precisión	28490 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Valery Guayas	35	16	67% Precisión	27760 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
wladimir alcivar brion...	34	17	65% Precisión	27240 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Emily Sánchez (Emily S...)	28	24	54% Precisión	25270 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Genesis Vite (Genesis ...)	31	21	60% Precisión	25000 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Orly Chavez	28	23	54% Precisión	20880 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Eduardo Dueñas M	27	25	52% Precisión	20770 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Oscar Erazo	27	22 3	52% Precisión	20580 Puntuación	✉ Correo electrónico a progenitor
Harold Soledispa (Haro...)	24	28	46% Precisión	17260 Puntuación	
Genesis Escalante (Ge...)					

Buscar

Informes

Lecciones nuevo



Enter Code

Andrea Manzano

Plan: Básico

Actualiza a Super

Crear

Explorar

Mi biblioteca

Informes

Clases

Ajustes

Más

1 intento

Precisión Puntuación

Gardenia Garcia (Gard...
1 intento

20

25

7

38%
Precisión

15260
Puntuación

Correo electrónico a progenitor