

#	Pregunta	Tipo de pregunta
1	Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada	Opción multiple
2	¿Fármaco utilizado como cardioprotector?	Opción multiple
3	Son principios del uso clínico de antiarrítmicos:	Opción multiple
4	La Hepcidina es una hormona que regula el metabolismo del hierro	Opción multiple
5	En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?	Opción multiple
6	Saxagliptina es un fármaco..	Opción multiple
7	Efecto Incretínico se refiere a	Opción multiple
8	De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I	Opción multiple
9	Qué puede dificultar la absorción de hierro en un paciente (selecciona más de una alternativa)	casilla de verificación
10	Indique qué desventajas del hierro IV (selecciona más de una alternativa)	casilla de verificación
11	Biomarcadores de anemia más importantes	casilla de verificación
12	Qué recomendaciones nutricionales se debe de indicar en un paciente que sufre anemia	casilla de verificación
13	El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:	Opción multiple
14	La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario	Opción multiple
15	Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h	Opción multiple
16	¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos?	Opción multiple
17	¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides?	Opción multiple
18	tratamiento de primera línea para dolor neuropático	Opción multiple
19	¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides?	Opción multiple

20	Un característica de un analgésico narcótico es:	Opción multiple
21	Eritropoyetina se produce en:	Opción multiple
22	Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal.	Opción multiple
23	Los desequilibrios de potasio afectan principalmente	Opción multiple
24	Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente?	Opción multiple
25	Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?	Opción multiple
26	El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:	Opción multiple
27	La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:	Opción multiple
28	Señale las tasas de filtración glomerular correctas	Opción multiple
29	Qué cantidad de masa renal puede llegar a perder el paciente antes de tener síntomas de enfermedad Renal?	Opción multiple
30	Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la preescrición del ejercicio ud la preescribiría a intensidad:	Opción multiple
31	Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al:	Opción multiple
32	Cuáles son las enfermedades subayacentes más comunes que pueden inducir un daño renal?	Opción multiple
33	Qué hipoglicemieante se debe de suspender cuando el filtrado glomerular es menor a 30?	Opción multiple
34	Un paciente con pre-diálisis necesita un consumo determinado de proteínas, Cuál sería el indicado?	Opción multiple

35	Un paciente con hemodiálisis necesita un consumo determinado de proteínas, Cuál sería el indicado?	Opción multiple
36	Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?	Opción multiple
37	En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que:	Opción multiple
38	Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C > 8.5%	Opción multiple
39	Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca:	Opción multiple
40	El efecto que tiene la COX1 es principalmente	Opción multiple
41	Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II	Opción multiple
42	Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso	Opción multiple
43	Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes	Opción multiple
44	Insulina Accion Prolongada	casilla de verificación
45	La terapia ideal para la esteatosis hepatica es	Opción multiple
46	Insulina NPH Inicio	Opción multiple
47	La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina:	Opción multiple
48	El omeprazol es un antiácido	Opción multiple
49	Qué fármacos son antiácidos (seleccione más de una alternativa)	casilla de verificación
50	A qué grupo pertenece los bloqueantes H2, Inhibidores de la bomba de protones, Bloqueantes muscarínicos, agonistas proglándínicos	Opción multiple
51	Es correcto afirmar sobre la ranitidina	Opción multiple
52	La combinación COMBIVIR contiene	Opción multiple
53	Cuando se consume un protector gástrico y antiácidos qué recomendaciones se debe de indicar	Opción multiple
54	El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en:	Opción multiple

55	Fármaco agonista prostanglandinas que es contraindicado en el embarazo	Opción multiple
56	Paciente con VIH controlado se define como	Opción multiple
57	Un efecto pleiotrópico de las estatinas es:	Opción multiple
58	Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es	Opción multiple
59	Inhibidor del correceptor CCR5:	Pregunta abierta
60	Una buena y segura combinación para dislipidemias mistas sería	Opción multiple
61	En la primera línea de tratamiento en dislipidemias y por tanto la familia de hipolipemiantes más utilizadas son:	Opción multiple
62	Seleccione 2 fármacos que pertenecen a la familia de estatinas	casilla de verificación
63	Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas	Opción multiple
64	La famotidina es (mas de 1 correcta)	casilla de verificación



Ver datos del jugador

Precisión de la pregunta	Tiempo promedio por pregunta (mm:ss)	Correcto	Incorrecto	No intentado	Carmen Matias (Carmen Matias)
79%	00:09	23	6	0	metildopa
86%	00:11	25	4	0	Enalapril
96%	00:13	28	1	0	Todas las arteri
79%	00:14	23	6	0	Verdadero
					Añado insulina l
86%	00:20	25	4	0	
62%	00:15	18	11	0	inhibidor de dis
93%	00:17	27	2	0	Todas las arteri
					Falla de células
68%	00:18	20	9	0	
					Dosis de hierro
27%	00:28	8	21	0	
					Aumento del st
34%	00:24	10	19	0	
72%	00:12	21	8	0	Hemoglobina y
					Aumentar el co
6%	00:25	2	27	0	
					Falso
79%	00:09	23	6	0	
					Verdadero
96%	00:06	28	1	0	
					Oxaprozina
79%	00:11	23	6	0	
					Enfermedad inf
93%	00:14	27	2	0	
					Inhibición de la
89%	00:17	26	3	0	
					amitriptilina
75%	00:17	22	7	0	
					Un paciente tor
93%	00:29	27	2	0	

93%	00:13	27	2	0	Todas las arteri
72%	00:08	21	8	0	Riñon
93%	00:12	27	2	0	Falso
75%	00:21	22	7	0	La conducción y
					Clofibrato
82%	00:21	24	5	0	
					Enoxaparina
82%	00:17	24	5	0	
72%	00:16	21	8	0	Manejo de la Hi
					Sindrome Nefríc
89%	00:11	26	3	0	
72%	00:18	21	8	0	G1 FG > 90, G2
					80%
75%	00:15	22	7	0	
					Moderada
89%	00:15	26	3	0	
					100%
93%	00:11	27	2	0	
100%	00:11	29	0	0	Todas las arteri
					Metformina
89%	00:16	26	3	0	
75%	00:17	22	7	0	Menor consum

79%	00:09	23	6	0	Mayor consumo
65%	00:14	19	10	0	inmunosupresio
68%	00:23	20	9	0	Producen menc
65%	00:12	19	10	0	Metformina e ir
96%	00:16	28	1	0	Nodulo sinoauri
75%	00:13	22	7	0	Efecto protecto
75%	00:08	22	7	0	Metformina
86%	00:14	25	4	0	SGLT2 o GLP1
79%	00:12	23	6	0	Orlistat
48%	00:15	14	15	0	Detemir,Glargir
68%	00:09	20	9	0	Vitamina E y pic
96%	00:09	28	1	0	1hr30Min
89%	00:14	26	3	0	Resistencia a la
68%	00:07	20	9	0	Falso
82%	00:09	24	5	0	hidróxido de alu
51%	00:15	15	14	0	antisecretores
55%	00:19	16	13	0	antisecreto
68%	00:09	20	9	0	Zidovudina + La
86%	00:14	25	4	0	Esperar al menc
72%	00:13	21	8	0	En todas las per

72%	00:11	21	8	0	Misoprostol
55%	00:24	16	13	0	carga viral indet
51%	00:17	15	14	0	Inhibir la respue
62%	00:08	18	11	0	Vicriviroc
100%	00:23	29	0	0	Maraviroc
58%	00:14	17	12	0	Estatina + Omeq
82%	00:10	24	5	0	Estatinas
3%	00:11	1	28	0	Atorvastatina,S
51%	00:12	15	14	0	Bloquea la enzi
55%	00:18	16	13	0	Antisecretor,inf
73%	15:33	1373	483	0	93 %

lor

Ver datos de tiempo

Ver res

Todas las anteriTodas las anteriTodas las anteriTodas las anteriTodas las anteriTodas las anteri

Riñon Riñon Riñon Riñon Riñon Riñon
Falso Falso Falso Falso Falso Falso

La conducción y La conducción y

Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato

Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina

Manejo de la Hi Manejo de la Hi

Síndrome Nefr Síndrome Nefr Síndrome Nefr Síndrome Nefr Síndrome Nefr Síndrome Nefr

G1 FG > 90, G2 G1 FG > 90, G2

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Todas las anteriTodas las anteriTodas las anteriTodas las anteriTodas las anteriTodas las anteri

Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina

Menor consum Menor consum Menor consum Menor consum Menor consum Menor consum

Mayor consumo					
inmunosupresic	inmunosupresic	inmunosupresic	inmunosupresic	inmunosupresic	inmunosupresic
Producen menci					
Metformina e i					
Nodulo sinoaur					
Efecto protecto	Efecto protecto	Efecto protecto	Efecto analgésic	Efecto protecto	Efecto protecto
Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina
SGLT2 o GLP1					
Orlistat	Orlistat	Orlistat	Dietilpropion	Orlistat	Orlistat
Detemir,Glargir	Detemir,Glargir	Detemir,Glargir	Detemir,Glargir	Degludec,Deter	Degludec,Deter
Vitamina E y pic					
1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min
Resistencia a la					
Falso	Falso	Verdadero	Falso	Falso	Falso
hidróxido de al	Cimetidina,Pire				
antisecretores	antisecretores	antisecretores	antisecretores	antisecretores	antisecretores
antisecretor, in	antisecretor an	antisecretor, in	antisecretor an	antisecretor an	antisecretor an
Zidovudina + La	Abacavir + Dida				
Esperar al menci					
En todas las per	Cuenta de Linfo	En todas las per			

Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol	Omeprazol
carga viral inde	carga viral inde	carga viral inde	carga viral inde	carga viral inde	carga viral inde
Inhibir la respue	Inhibir la respue	Inhibir la respue	Inhibir la respue	Disminuir el col	Inhibir la respue
Vicriviroc	Vicriviroc	Vicriviroc	Vicriviroc	Vicriviroc	Vicriviroc
Maviric	Maviric	Maraviroc	maridvic	marvaric	omeprasol
Estatina + Ome	Estatina + Ome	Estatina + Ome	Estatina + Ome	Estatina + Ome	Estatina + Ome
Estatinas	Estatinas	Estatinas	Estatinas	Estatinas	Estatinas
Atorvastatina,Si	Atorvastatina,Si	Atorvastatina,S	Colesevelam,Sir	Atorvastatina,S	Atorvastatina,S
Bloquea la enzi	Bloquea la enzi	Bloquea la enzi	Bloquea la enzi	Inhibición de la	Bloquea la enzi
Antisecretor,inl	Antisecretor,inl	Antisecretor,inl	Antisecretor,inl	Antisecretor,inl	Antisecretor,inl
90 %	90 %	89 %	87 %	87 %	89 %

sumen

Todas las anteriores					
Todas Falso	Riñon Falso	Riñon Falso	Riñon Falso	Riñon Falso	Médula Osea Falso
La conducción y Clofibrato					
Enoxaparina	Enoxaparina	Enoxaparina	Enoxaparina	Enoxaparina	Enoxaparina
Manejo de la Hiperlipidemia					
Síndrome Nefrítico					
G1, FG <= 100.0	G1 FG > 90, G2	G1, FG <= 100.0	G1 FG > 90, G2	G1 FG > 90, G2	G1 FG > 90, G2
80%	80%	80%	80%	80%	80%
Moderada	Moderada	Moderada	Moderada	Moderada	Moderada
100%	100%	100%	100%	100%	100%
Todas las anteriores					
Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina
Mayor consumo	Menor consumo				

Mayor consumo	Mayor consumo	Mayor consumo	Mayor consumo	Mayor consumo	Mayor consumo
inmunosupresic	inmunosupresic	inmunosupresic	inmunosupresic	inmunosupresic	inmunosupresic
Producen menci	No producen H	Producen menci	Producen menci	Producen menci	Producen menci
Metformina e i	Metformina e i	Metformina e i	Metformina e i	Metformina e i	Metformina e i
Nodulo sinoaur	Nodulo sinoaur	Nodulo sinoaur	Nodulo sinoaur	Nodulo sinoaur	Nodulo sinoaur
Efecto protecto	Efecto protecto	Efecto daño gñ	Efecto protecto	Efecto protecto	Efecto protecto
Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina
SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1
Orlistat	Orlistat	Orlistat	Orlistat	Orlistat	Orlistat
Detemir,Glargir	Detemir,Glargir	Detemir,Glargir	Detemir,Glargir	Detemir,Glargir	Detemir,Glargir
Vitamina E y pic	Vitamina E y pic	Vitamina E y pic	Vitamina E y pic	Vitamina E y pic	Vitamina E y pic
1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min
Resistencia a la	Sensibilidad a la	Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la
Verdadero	Falso	Falso	Falso	Falso	Falso
hidróxido de al	hidróxido de al	hidróxido de al	hidróxido de al	hidróxido de al	hidróxido de al
antisecretores	antisecretores	antisecretores	antisecretores	antisecretores	Todas las anteri
antisecretor an	antisecretor an	antiácido antag	antisecretor an	antisecretor an	antisecretor an
Zidovudina + La	Zidovudina + La	Zidovudina + La	Zidovudina + La	Zidovudina + La	Zidovudina + La
Esperar al menci	Consumir los fá	Esperar al menci	Esperar al menci	Esperar al menci	Consumir los fá
En todas las per	Carga viral VIH :	En todas las per	En todas las per	Carga viral VIH :	En todas las per

Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol
carga viral inde	carga viral dete	carga viral inde	carga viral inde	carga viral dete	carga viral inde
Inhibir la respue	Inhibir la respue	Inhibir la respue	Disminuir el col	Inhibir la respue	Disminuir el col
Vicriviroc	Vicriviroc	Vicriviroc	Vicriviroc	Amprenavir	Vicriviroc
Maraviroc	vicriviroc	c	victoror	Amprenavir	vivricoc
Estatina + Ome	Estatina + Ezetii	Estatina + Ome	Estatina + Ezetii	Fibrato + estatii	Estatina + Ezetii
Estatinas	Estatinas	Estatinas	Estatinas	Fibratos	Estatinas
Atorvastatina,Si	Atorvastatina,Si	Atorvastatina	Atorvastatina,Si	Atorvastatina,Si	Atorvastatina,Si
Bloquea la enzi	Bloquea la enzi	Bloqueo del int	Inhibición de la	Inhibición de la	Bloquea la enzi
Antisecretor,inl	Antisecretor,inl	Antisecretor	Antisecretor	Antisecretor,inl	Antisecretor,Es
84 %	82 %	87 %	87 %	81 %	84 %

Todas las arteri					
Riñon	Riñon	Riñon	Riñon	Riñon	Riñon
Falso	Falso	Falso	Falso	Falso	Falso
La conducción y					
Clofibrato	Clofibrato	Clofibrato	Clofibrato	Clofibrato	Simvastatina
Enoxaparina	Rivaroxabán	Enoxaparina	Enoxaparina	Enoxaparina	Ácido acetilsalic
Manejo de la Hi					
Síndrome Nefr	Pilonefritis				
G1 FG > 90, G2					
80%	80%	80%	80%	80%	30%
Moderada	Moderada	Moderada	Moderada	Moderada	Moderada
100%	100%	100%	100%	100%	100%
Todas las arteri					
Atorvastatina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina
Menor consum	Menor consum	Mayor consum	Menor consum	Menor consum	Menor consum

Mayor consumo	Mayor consumo	Menor consumo	Mayor consumo	Mayor consumo	Eliminar el consumo
inmunosupresión	inmunosupresión	inmunosupresión	todas las anteriores	inmunosupresión	todas las anteriores
Producen menor	Producen menor	Producen menor	Producen menor	Producen menor	Producen menor
Metformina e insulina	Metformina e insulina	Metformina e insulina	Metformina e insulina	Terapia combinada	Metformina e insulina
Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo Auricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular
Efecto protector	Efecto protector	Efecto protector	Efecto protector	Efecto protector	Efecto protector
Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Insulina
SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	Metformina
Orlistat	Orlistat	Orlistat	Orlistat	Orlistat	Orlistat
Análogos de Insulina	Detemir, Glargir	Análogos de Insulina	Degludec, Deter	Detemir	Degludec, Glargir
Vitamina E y pic	Vitamina E y pic	Vitamina E y pic	Vitamina E y pic	GLP1 y Corticoides	Vitamina E y pic
1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min
Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la
Falso	Falso	Falso	Falso	Verdadero	Falso
hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio
antisecretores	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Todas las anteriores	antisecretores	Protectores de
antisecretor anti	antisecretor anti	antiácido anti	antisecretor anti	antisecretor anti	antisecretor anti
Zidovudina + Lamivudina	Tenofovir + Emtricitabina	Tenofovir + Emtricitabina	Abacavir + Didanosina	Tenofovir + Emtricitabina	Zidovudina + Lamivudina
Esperar al menos	Esperar al menos	Esperar al menos	Esperar al menos	Esperar al menos	Esperar al menos
En todas las per	En todas las per	En todas las per	En todas las per	Carga viral VIH	En todas las per

Misoprostol	Omeprazol	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol
carga viral inde					
Disminuir el col	Disminuir el col	Aumental el Co	Disminuir el col	Disminuir el col	Inhibir la respue
Enfuvirtida	Amprenavir	Vicriviroc	Amprenavir	Amprenavir	Amprenavir
c	metildopa	Maraviroc	esa no me la sé	Tenofovir	marvaric
Fibrato + estati	Estatina + Ome	Estatina + Ezet	Estatina + Ezet	Fibrato + estati	Estatina + Ome
Estatinas	Estatinas	Estatinas	Fibratos	Omega 3	Estatinas
Atorvastatina,Si	Atorvastatina,Si	Atorvastatina,Si	Atorvastatina,Si	Atorvastatina,S	Atorvastatina,C
Inhibición de la	Inhibición de la	Bloquea la enzi	Bloqueo del int	Inhibición de la	Bloquea la enzi
Antiacido,Antis	Antisecretor,inl	Antiacido,Antis	Antiacido,Antis	Es un neutraliza	Es un neutraliza
81 %	81 %	78 %	76 %	71 %	75 %

Todas las anteriores	Se emplean par				
Todas Verdadero	Riñon Falso	Riñon Falso	Riñon Falso	Médula Osea Falso	Todas Verdadero
La función neur	La conducción y	La conducción y	La función gástr	La función gástr	La conducción y
Clofibrato	Clofibrato	Clofibrato	Clofibrato	Clofibrato	Clofibrato
Enoxaparina	Rivaroxabán	Enoxaparina	Enoxaparina	Enoxaparina	Enoxaparina
Manejo de la Hi					
Síndrome Nefr					
Ninguna de las	G1, FG > 90, G2	G1, FG > 90, G2	G1, FG > 90, G2	G1, FG <= 100.	Ninguna de las
30%	80%	80%	80%	80%	60%
Moderada	Moderada	Moderada	Moderada	Moderada	Moderada
100%	100%	100%	100%	100%	60%
Todas las anteriores					
Metformina	Metformina	Metformina	Metformina	Losartán	Metformina
Menor consumo	Menor consumo	Consumo de pr	Menor consumo	Menor consumo	Mayor consumo

Mayor consumo	Mayor consumo	Menor consumo	Mayor consumo	Mayor consumo	Mayor consumo
todas las anteriores	inmunosupresión	todas las anteriores	inmunosupresión	todas las anteriores	todas las anteriores
Son más potentes	Producen menos	No producen	Hi No producen	Hi No producen	Hi Se administran
Terapia combinada	Terapia combinada	Metformina	Terapia combinada	Terapia combinada	Metformina e insulina
Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular
Efecto dañino	Efecto protector	Efecto protector	Efecto analgésico	Efecto dañino	Efecto protector
Metformina	Metformina	Metformina	Insulina	Insulina	GLP-1
SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	Insulina	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1
Orlistat	Orlistat	Orlistat	Orlistat	Sibutramina	Fluoxetina
Detemir, Glargir	Análogos de Insulina	Análogos de Insulina	Análogos de Insulina	Análogos de Insulina	Degludec, Glargir
Vitamina E y pic	GLP1 y Corticoides	Vitamina D y ro	Vitamina D y ro	Vitamina E y pic	GLP1 y Corticoides
1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min	1hr30Min
Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la	Sensibilidad a la	Resistencia a la
Verdadero	Verdadero	Falso	Falso	Falso	Verdadero
hidróxido de aluminio	Pirenzepina, hidróxido de aluminio	Cimetidina, hidróxido de aluminio	Pirenzepina, hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio	Pirenzepina, hidróxido de aluminio
antiácidos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Todas las anteriores	antisecretorios	Todas las anteriores
antisecretor, in	antiácido antagonista	antisecretor, in	antiácido antagonista	antiácido antagonista	Antiácido inhibidor
Zidovudina + La	Abacavir + Didanosina	Zidovudina + La	Abacavir + Didanosina	Zidovudina + La	Zidovudina + La
Esperar al menos	Esperar al menos	Esperar al menos	Esperar al menos	Esperar al menos	No hay indicación
En todas las per	Carga viral VIH	Carga viral VIH	Carga viral VIH	En todas las per	En todas las per

ninguno	Omeprazol	ninguno	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostol
carga viral inde	carga viral inde	carga viral inde	carga viral dete	carga viral inde	carga viral inde
Inhibir la respue	Disminuir el col	Aumental el Co	Inhibir la respue	Aumental el Co	Disminuir el col
Vicriviroc	Amprenavir	Vicriviroc	Enfuvirtida	Vicriviroc	Amprenavir
maraviroc	omeprazol	fibrosis	.	marvaric	artovastatina
Estatina + Ome	Estatina + Ome	Estatina + Ome	Estatina + Ome	Estatina + Ome	Estatina + Ome
Estatinas	Estatinas	Fibratos	Estatinas	Estatinas	Omega 3
Atorvastatina,S	Colesevelam,Fe	Atorvastatina,S	Atorvastatina,S	Atorvastatina,S	Atorvastatina,S
Bloquea la enzi	Inhibición de la	Bloquea la enzi	Inhibición de la	Bloqueo del int	Bloquea la enzi
Antisecretor,in	Antisecretor,Es	Es un neutraliza	Antisecretor,in	Antisecretor,in	Antisecretor,in
67 %	68 %	65 %	64 %	60 %	48 %

Alexis Alcocer Naula (Alexis Alcocer Naula)	Oyuqui Loqui (Oyuqui Loqui)	Milka Romero (Milka Romero)	Santiago Moscoso Yulan (Santiago Moscoso)
metildopa	metildopa	metildopa	propranolol
Metformina	Enalapril	Salbutamol	Salbutamol
Todas las anteriores	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Identificación y eliminación de factores precipitantes
Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
Continuo con metformina	Añado insulina	Añado insulina	Añado insulina cristalina
beta bloqueador	inhibidor de dihidrogenasa reductasa	inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo proximal	inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo proximal
mejora la secreción de insulina	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Todas las anteriores
Falla de células beta	Obesidad	Síndrome metabólico	Resistencia periférica a la insulina
Enfermedad renal	Enfermedad renal	Dosis de hierro	Inflamación aguda, Medicamentos
hormonas tiroideas	Aumento del estrés oxidativo	Aumento del estrés oxidativo	Aumento del estrés oxidativo, Genera Anafilaxia, Infecciones
Hemoglobina y hematocrito	todas las anteriores	todas las anteriores	todas las anteriores
Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos	Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos	Reducir el consumo de carnes magras, pescados y mariscos	Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos
Falso	Verdadero	Verdadero	Verdadero
Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
Diclofenaco	Ketoprofeno	Diclofenaco	Paracetamol
Enfermedad inflamatoria intestinal	Hipertensión	Hipertensión	Enfermedad inflamatoria intestinal
Aumento de la absorción de calcio	Aumento de la absorción de calcio	Aumento de la absorción de calcio	Inhibición de la absorción de calcio
amitriptilina	AINES como paracetamol	OPIOIDE: codeína	amitriptilina
Un paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente	Un paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente	Un paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente	Un paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente

Todas las anteriores Se emplean para dolores intensos.

Riñón	Médula Osea	Todas	Todas
Falso	Falso	Falso	Falso

La función neu La función neur El equilibrio osr La función neuromuscular

Gemfibrozilo	Simvastatina	Simvastatina	Ezetimiba
--------------	--------------	--------------	-----------

Enoxaparina	Ácido acetilsalic	Ácido acetilsalic	Enoxaparina
-------------	-------------------	-------------------	-------------

Manejo de la Hi Manejo de la Hi Manejo de la Hi Manejo de la Hipertension

Síndrome Nefr Síndrome Nefr Síndrome Nefr Síndrome Nefrótico

G1, FG <= 100. G1, FG <= 100. G1 FG > 90, G2 G1, FG <= 100. G2, FG <= 70-89. G3, FG= 42-59, 3b= FG 30-44.

30%	30%	30%	60%
-----	-----	-----	-----

Leve	Leve	Normal	Moderada
------	------	--------	----------

100%	100%	60%	100%
------	------	-----	------

Todas las anteriores Todas las anteriores Todas las anteriores Todas las anteriores

Metformina	Atorvastatina	Metformina	Metformina
------------	---------------	------------	------------

Consumo de pr Menor consumo Consumo de pr Mayor consumo de proteínas

Mayor consumo	Consumo de proteínas	Consumo de proteínas	Menor consumo de proteínas
todas las anteriores	todas las anteriores	todas las anteriores	todas las anteriores
Producen menor	No producen Hiperpotasemia	No producen Hiperpotasemia	No producen Hiperpotasemia
Metformina	Terapia combinada	Terapia combinada	Insulina
Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular	Nodulo sinoauricular
Efecto protector	efecto anti-inflamatorio	Efecto protector	efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico
Insulina	Insulina	Metformina	GLP-1
Metformina	SGLT2 o GLP1	SGLT2 o GLP1	TZD
Orlistat	Sibutramina	Fluoxetina	Dietilpropion
Degludec	Degludec, Deter	Detemir, Glargir	Degludec
Vitamina D y ro	Vitamina D y ro	GLP1 y Corticoides	GLP1 y Corticoides
1hr30Min	30/60 Min	1hr30Min	1hr30Min
Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la	Resistencia a la insulina
Falso	Verdadero	Verdadero	Verdadero
hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio	hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio
Todas las anteriores	Todas las anteriores	antiácidos	Todas las anteriores
Antiácido inhibe	antiácido antagonista	antisecretor, inhibe	antisecretor antagonista receptores H2
Abacavir + Didanosina	Zidovudina + La	Zidovudina + La	Tenofovir + Emtricitabina
Esperar al menos	Consumir los fármacos	Esperar al menos	Esperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos
Carga viral VIH	En todas las personas	En todas las personas	En todas las personas con infección por VIH independientemente

Ranitidina	Misoprostol	Ranitidina	Ranitidina
carga viral dete	carga viral inde	carga viral inde	carga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones e
Inhibir la respue	Inhibir la respue	Aumental el Co	Disminuir el colesterol LDL
Amprenavir	Vicriviroc	Vicriviroc	Enfuvirtida
fibril	Vicriviroc	.	Vicridovic
ASA+ Vit B3	ASA+ Vit B3	Estatina + Ezeti	Estatina + Ezetimiba
Estatinas	Estatinas	Estatinas	Estatinas
Atorvastatina, Si	Atorvastatina, Si	Atorvastatina, Si	Atorvastatina, Simvastatina
Bloquea la enzi	Bloqueo del int	Bloqueo del int	Bloqueo del intercambio de apo-lipoproteinas APOE y APOC 2
Antiacido, Antis	Es un neutraliza	Antisecretor, in	Antisecretor, Es un neutralizador del acido clorhidrico
50 %	42 %	42 %	35 %

,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina

en los últimos 3 meses y adherente al manejo antiretroviral