

Año:	2025	Periodo:	II PAO
Materia:	Ecuaciones Diferenciales y Álgebra Lineal	Profesores:	Jesús Aponte, Eduardo Rivadeneira, Colón Mario Céllerí
Evaluación:	Segunda	Fecha:	26 de enero de 2026

### **COMPROMISO DE HONOR**

Yo, \_\_\_\_\_, al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que solo puedo un lápiz o esferográfico y borrador, que sólo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen y que cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído debo apagarlo y depositarlo donde se me indique, junto con cualquier otro material que se encuentre acompañándome. No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a los que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.

**Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior.**

“Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar”.

Firma: \_\_\_\_\_ Número de matrícula: \_\_\_\_\_ Paralelo: \_\_\_\_\_

1. Sea  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la única transformación lineal que satisface

$$\begin{aligned} T(1, 0, 0) &= (1, 0, 0) \\ T(0, 1, 0) &= (1, 1, 0) \\ T(0, 0, 1) &= (1, 1, 1). \end{aligned}$$

- (a) (4 puntos) Halle la regla de correspondencia de  $T$ .
- (b) (4 puntos) Demuestre que  $T$  es invertible y halle la regla de correspondencia de  $T^{-1}$ .
- (c) (2 puntos) Halle la regla de correspondencia del operador  $2T - T^{-1}$ .

**Solución:**

- (a) Como se conocen las imágenes de los vectores de la base canónica de  $\mathbb{R}^3$ , la regla de correspondencia de  $T$  puede representarse matricialmente como

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

- (b) La matriz  $A$  es invertible, con inversa

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto,  $T$  es invertible. Además, la regla de correspondencia de  $T^{-1}$  es

$$T^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 - x_3 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

- (c) La matriz de  $2T - T^{-1}$ , respecto a la base canónica de  $\mathbb{R}^3$ , es

$$2A - A^{-1} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, la regla de correspondencia de  $2T - T^{-1}$  es

$$(2T - T^{-1}) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\ x_2 + 3x_3 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

**Rúbrica:**

Halla la regla de correspondencia $T$	1–3 puntos
Demuestra que $T$ es invertible y halla la regla de correspondencia de $T^{-1}$	1–4 puntos
Halla la regla de correspondencia de $2T - T^{-1}$	1–3 puntos

2. Sea  $T: M_{2 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 2}$  la transformación lineal dada por

$$T(A) = \text{tr}(A) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

donde  $\text{tr}(A)$  denota la *traza* de la matriz  $A$ .

- (a) (5 puntos) Halle una base para la imagen de  $T$ .
- (b) (5 puntos) Halle una base para el núcleo de  $T$ .

**Solución:**

(a) Vemos que

$$T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$\text{Im}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Como un conjunto con único vector no nulo siempre es independiente, se sigue que

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base para  $\text{Im}(T)$ .

- (b) Note que  $T(A) = 0$  si, y solamente si,  $\text{tr}(A) = 0$ . Luego, los elementos del núcleo de  $T$  son las matrices de la forma

$$\begin{bmatrix} -d & b \\ c & d \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, el núcleo de  $T$  es generado por el conjunto

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Tal conjunto también es una base para el núcleo de  $T$ . De hecho,

$$\dim N(T) = \dim M_{2 \times 2} - \dim \text{Im}(T) = 4 - 1 = 3,$$

de manera que un conjunto generador de  $N(T)$  con tres vectores debe ser una base.

**Rúbrica:**

Halla una base para $\text{Im } T$	1–5 puntos
Halla una base para $N(T)$	1–5 puntos

3. (10 puntos) Halle la solución general del sistema de ecuaciones

$$y' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} y.$$

**Solución:**

El polinomio característico de la matriz asociada al sistema es

$$p(\lambda) = 15 + 17\lambda + \lambda^2 - \lambda^3 = (5 - \lambda)(-3 + \lambda)(-1 + \lambda),$$

de donde se obtienen los valores propios 5, -3 y -1. Los espacios propios correspondientes son

$$E_5 = \text{gen}\{(1, 1, 1)\},$$

$$E_{-3} = \text{gen}\{(0, -1, 1)\},$$

y

$$E_{-1} = \text{gen}\{(-2, 1, 1)\}.$$

De aquí obtenemos las soluciones l.i.

$$y_1(t) = e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad y_2(t) = e^{-3t} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad y_3(t) = e^{-t} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

y la solución general es por tanto

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) + c_3 y_3(t) = \begin{bmatrix} c_1 e^{5t} - 2c_3 e^{-t} \\ c_1 e^{5t} - c_2 e^{-3t} + c_3 e^{-t} \\ c_1 e^{5t} + c_2 e^{-3t} + c_3 e^{-t} \end{bmatrix}.$$

**Rúbrica:**

Calcula correctamente el polinomio característico y los valores propios	1–3 puntos
Calcula correctamente los espacios propios correspondientes	1–4 puntos
Halla la solución general	1–3 puntos

4. (10 puntos) Determine los valores de  $k$  que hacen de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

una matriz diagonalizable.

**Solución:**

Primero, calculamos el polinomio característico:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & k \\ 1 & 2 - \lambda & 0 \\ 1 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(1 - \lambda) - 0 + k(1 - (2 - \lambda))$$

$$P(\lambda) = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda) + k(\lambda - 1) = (\lambda - 1)[(1 - \lambda)(2 - \lambda) - k] = 0$$

$$P(\lambda) = (\lambda - 1)[\lambda^2 - 3\lambda + (2 - k)] = 0.$$

Vemos que los valores propios de  $A$  son

$$\lambda_1 = 1 \quad \text{y} \quad \lambda_{2,3} = \frac{3 \pm \sqrt{1 + 4k}}{2}$$

Luego:

- Si  $k > -1/4$  y  $k \neq 0$ , existen 3 valores propios reales y distintos, de manera que  $A$  es diagonalizable.
- Si  $k = 0$ , hay dos valores propios  $\lambda_{1,2} = 1$ ,  $\lambda_3 = 2$ , con  $m_a(1) = 2$ . Calculamos la multiplicidad geométrica  $m_g(1) = \dim(N(A - I))$ :

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies m_g(1) = 3 - 1 = 2.$$

Como  $m_a(1) = m_g(1)$ , para  $k = 0$   $A$  es diagonalizable.

- Si  $k = -1/4$ , hay dos valores propios  $\lambda_1 = 1$  y  $\lambda_{2,3} = 3/2$ . Esto es,  $m_a(3/2) = 2$ . Pero,

$$A - \frac{3}{2}I = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & -1/4 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1 & -1/2 \end{bmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies m_g(3/2) = 3 - 2 = 1.$$

Como  $m_g(3/2) < m_a(3/2)$ , se tiene que  $A$  no es diagonalizable en este caso.

En conclusión, si  $k > 1/4$ ,  $A$  es diagonalizable.

5. (10 puntos) Resuelva el problema de valor inicial

$$y'' + 3y' + 2y = H(t - 1), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0,$$

donde  $H$  denota la función de Heaviside.

**Solución:** Aplicamos  $\mathcal{L}$  en ambos lados de la ecuación y obtenemos

$$(s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)) + 3(sY(s) - y(0)) + 2Y(s) = \frac{e^{-s}}{s}.$$

Sustituyendo las condiciones iniciales, nos queda

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = \frac{e^{-s}}{s} \implies Y(s) = \frac{e^{-s}}{s(s+1)(s+2)}.$$

Sea  $F(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$ . Hallemos números reales  $A, B$  y  $C$  tales que

$$\frac{1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}.$$

De hecho,  $A = \frac{1}{2}$ ,  $B = -1$  y  $C = \frac{1}{2}$ , de manera que

$$F(s) = \frac{1}{2s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2(s+2)}.$$

Aplicando la transformada de Laplace inversa y el teorema de la traslación nos da  $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)H(t-a)$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)e^{-s}\} = \left[ \frac{1}{2} - e^{-(t-1)} + \frac{1}{2}e^{-2(t-1)} \right] H(t-1).$$

#### Rúbrica:

Aplica correctamente la transformada de Laplace	1 punto
Calcula correctamente $Y(s)$ y la descompone en fracciones parciales	1–2 puntos
Aplica correctamente la transformada inversa de Laplace y el teorema de la traslación	1–2 puntos
Resuelve el PVI.	1–2 puntos