

Quizizz

Examen Final de Farmacología y Nutrición
PAO 2

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

71

Accuracy %
(correct / total)

53

Number of
Questions

27

Number of Players

Players

| Rank | Player Name | Avg. Time | Score | Accuracy | Correct / Total | |
|------|--|-----------|-------|----------|-----------------|--|
| 1 | Ximena Echanique (Ximena Echanique) | 45 secs | 33090 | 85% | 45 / 53 | |
| 2 | Mishelle Rosero (Mishelle Rosero C.) | 29 secs | 32630 | 72% | 38 / 53 | |
| 3 | Cesia Rodriguez (Cesia Rodriguez) | 31 secs | 32630 | 74% | 39 / 53 | |
| 4 | Fiorella Parra (Fiorella Parra Cañarte) | 36 secs | 32480 | 77% | 41 / 53 | |
| 5 | Arianna Campos | 28 secs | 32420 | 72% | 38 / 53 | |
| 6 | Angie Gonzalez | 35 secs | 32410 | 75% | 40 / 53 | |
| 7 | Maria Ponce (Maria Del Carmen Cortez P) | 33 secs | 31730 | 72% | 38 / 53 | |
| 8 | Jennifer Diaz | 42 secs | 31150 | 79% | 42 / 53 | |
| 9 | Maria Romero Quevedo (Maria Cristina Romero) | 35 secs | 30970 | 72% | 38 / 53 | |
| 10 | Gabriela Baidal | 30 secs | 30940 | 68% | 36 / 53 | |
| 11 | Allen . (Allen Borbor) | 39 secs | 30800 | 74% | 39 / 53 | |
| 12 | José Portocarrero (Abraham Portocarrero) | 34 secs | 30340 | 70% | 37 / 53 | |
| 13 | Rommy Zambrano (Rommyna Zambrano) | 43 secs | 30310 | 77% | 41 / 53 | |
| 14 | Maria Andrea Martinez (Maria Andrea Martinez) | 22 secs | 29650 | 62% | 33 / 53 | |
| 15 | karelys tomala | 32 secs | 29550 | 68% | 36 / 53 | |
| 16 | Erick Ramirez (Erick Ramirez) | 40 secs | 29510 | 72% | 38 / 53 | |
| 17 | Luisa Guerra | 36 secs | 29480 | 66% | 35 / 53 | |
| 18 | Gabriela Espinosa | 32 secs | 27560 | 62% | 33 / 53 | |
| 19 | Yuleidy Aroca | 38 secs | 26850 | 64% | 34 / 53 | |
| 20 | Sandra Elizabeth Borbor Cedeño (Sandra Elizabeth Borbor C) | 33 secs | 24360 | 55% | 29 / 53 | |
| 21 | Michelle Stephanie Loja Vera (Michelle Loja Vera) | 45 secs | 23490 | 60% | 32 / 53 | |
| 22 | Irene Rodriguez (Irene Rodriguez) | 51 secs | 23010 | 58% | 31 / 53 | |
| 23 | Fiorella Hernández | 46 secs | 19220 | 47% | 25 / 53 | |
| 24 | Melanie Paredes | 22 secs | 18330 | 40% | 21 / 53 | |
| 25 | Domenica Fejoó (Domenica Fejoó) | 35 secs | 17430 | 42% | 22 / 53 | |
| 26 | Samantha Montoya | 41 secs | 15410 | 38% | 20 / 53 | |
| 27 | Carlos Gonzalez Alvarado | 25 secs | 11270 | 25% | 13 / 53 | |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Ximena Echanique (Ximena Echanique)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

84%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

45

✓ Correct

4

✗ Incorrect

4

🔄 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 42 secs | 0 | ✗ enalapril |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🔄 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 44 secs | 710 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🔄 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada, ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 42 secs | 860 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🔄 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 64 secs | 780 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 40 secs | 730 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🔄 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 27 secs | 820 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 20 secs | 870 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 47 secs | 690 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 45 secs | 700 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 43 secs | 710 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 39 secs | 740 | ✓ amitriptilina |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 39 secs | 870 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 27 secs | 820 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 24 secs | 840 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 53 secs | 640 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 48 secs | 680 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 23 secs | 850 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 44 secs | 710 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 48 secs | 680 | ✓ La conducción y función cardíaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 72 secs | 760 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 37 secs | 870 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 44 secs | 710 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 60 secs | 800 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 38 secs | 740 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 55 secs | 0 | ✗ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 64 secs | 780 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 44 secs | 700 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 39 secs | 740 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 39 secs | 740 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 33 secs | 780 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 38 secs | 870 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 44 secs | 850 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 53 secs | 650 | ✓ inmunosupresión |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 92 secs | 690 | ✓ Producen menos tos como efecto adverso |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 56 secs | 620 | ✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 60 secs | 600 | ✓ Metformina e insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 55 secs | 630 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 60 secs | 600 | ✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 13 secs | 910 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 59 secs | 610 | ✓ SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 60 secs | 600 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 47 secs | 680 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 53 secs | 0 | ✗ Ondansetron |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 53 secs | 640 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 29 secs | 0 | ✗ DegludecDetemir |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 21 secs | 860 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 43 secs | 710 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 41 secs | 640 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 44 secs | 610 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Mishelle Rosero (Mishelle Rosero C.)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

71%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

38

✓ Correct

7

✗ Incorrect

8

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | - | - | 🕒 |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 14 secs | 910 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 22 secs | 920 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 16 secs | 940 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 26 secs | 830 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 30 secs | 800 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 16 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 18 secs | 880 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 6 secs | 960 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 19 secs | 870 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 60 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides? | 4 secs | 980 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 14 secs | 910 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 18 secs | 880 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, ii, etc, están a cargo de: | 25 secs | 830 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 13 secs | 910 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 19 secs | 870 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 30 secs | 800 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 41 secs | 730 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 37 secs | 870 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 41 secs | 860 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 52 secs | 650 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 62 secs | 790 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 16 secs | 890 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | - | - | ⊗ |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 27 secs | 910 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 36 secs | 760 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 61 secs | 0 | ✗ Amprenavir |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 17 secs | 890 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 23 secs | 850 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 30 secs | 900 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 20 secs | 930 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | - | - | ⊗ |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que: | 82 secs | 0 | ✗ No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 35 secs | 770 | ✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 61 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 18 secs | 880 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 59 secs | 0 | ✗ efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 25 secs | 830 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | - | - | ⊗ |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 61 secs | 0 | ✗ Fluoxetina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 17 secs | 890 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 5 secs | 970 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 27 secs | 820 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 18 secs | 760 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 31 secs | 790 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 15 secs | 900 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 12 secs | 890 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 21 secs | 810 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Cesia Rodriguez (Cesia Rodriguez)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

73%
Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

39

✓ Correct

8

✗ Incorrect

6

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 53 secs | 0 | ✗ enalapril |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 43 secs | 710 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 30 secs | 900 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretinico se refiere a | 21 secs | 930 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 19 secs | 870 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 22 secs | 850 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 19 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 48 secs | 680 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 27 secs | 820 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 20 secs | 860 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 59 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides? | 9 secs | 970 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 22 secs | 850 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 23 secs | 840 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, ii, etc, están a cargo de: | 28 secs | 810 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 45 secs | 700 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 20 secs | 860 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 29 secs | 800 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 18 secs | 880 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 24 secs | 920 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 21 secs | 930 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 28 secs | 810 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 16 secs | 940 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 16 secs | 890 | ✓ Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | - | - | ⊗ |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 42 secs | 860 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 15 secs | 900 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 47 secs | 680 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 28 secs | 810 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 22 secs | 850 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 20 secs | 930 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 17 secs | 940 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 54 secs | 0 | ✗ Antiinflamatorio y antipirético |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que: | 103 secs | 0 | ✗ Son más potentes |
| 39 | ¿Cuál <u>NO</u> es una característica de los diuréticos? | 52 secs | 0 | ✗ Aumentan la filtración glomerular |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 58 secs | 610 | ✓ Metformina e insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 17 secs | 880 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 57 secs | 0 | ✗ Efecto analgésico protector gástrico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 45 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 56 secs | 620 | ✓ SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 43 secs | 710 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 19 secs | 870 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 20 secs | 860 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 21 secs | 860 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | - | - | ⊗ |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 20 secs | 870 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 17 secs | 890 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 18 secs | 840 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 20 secs | 830 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Fiorella Parra (Fiorella Parra Cañarte)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

77%
Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

41

✓ Correct

7

✗ Incorrect

5

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 53 secs | 0 | ✗ propranolol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 44 secs | 710 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 34 secs | 880 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 24 secs | 920 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 30 secs | 800 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 25 secs | 830 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 27 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 52 secs | 650 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 26 secs | 820 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 22 secs | 850 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 56 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 8 secs | 970 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 17 secs | 890 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 37 secs | 750 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, ii, etc, están a cargo de: | 33 secs | 780 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 50 secs | 670 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 31 secs | 790 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 21 secs | 860 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 25 secs | 910 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 41 secs | 860 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 28 secs | 810 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 14 secs | 950 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 16 secs | 890 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 56 secs | 0 | ✗ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 29 secs | 900 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 35 secs | 770 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 49 secs | 670 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 34 secs | 770 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 51 secs | 660 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 17 secs | 940 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 48 secs | 840 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 55 secs | 0 | ✗ Antiinflamatorio y antipirético |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 102 secs | 0 | ✗ Son más potentes |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 54 secs | 0 | ✗ Aumentan la filtración glomerular |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 56 secs | 620 | ✓ Metformina e insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 27 secs | 820 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 57 secs | 620 | ✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 52 secs | 650 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 45 secs | 700 | ✓ SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 52 secs | 650 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 29 secs | 800 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 37 secs | 750 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 24 secs | 840 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 28 secs | 630 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 20 secs | 860 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 23 secs | 840 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 23 secs | 800 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 27 secs | 760 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Arianna Campos

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

71%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

38

✓ Correct

7

✗ Incorrect

8

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | - | - | 🕒 |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 44 secs | 700 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 31 secs | 890 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 18 secs | 940 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 25 secs | 830 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 12 secs | 920 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 13 secs | 910 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 31 secs | 790 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 41 secs | 730 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 23 secs | 850 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 52 secs | 0 | ✗ AINES como ibuprofeno |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 38 secs | 870 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 45 secs | 700 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 11 secs | 920 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de: | 18 secs | 880 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 12 secs | 920 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 20 secs | 860 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 10 secs | 930 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 28 secs | 810 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 34 secs | 880 | ✓ Clofibrato |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 21 secs | 930 | ✓ Enoxaparina |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 21 secs | 0 | ✗ Manejo de la Hiperlipidemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 17 secs | 940 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 11 secs | 920 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 59 secs | 0 | ✗ Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 36 secs | 880 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 17 secs | 880 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 12 secs | 920 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | - | - | ⊗ |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 27 secs | 820 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 27 secs | 910 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al: | 25 secs | 910 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | - | - | ⊗ |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que: | 76 secs | 740 | ✓ Producen menos tos como efecto adverso |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | - | - | ⊗ |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 40 secs | 0 | ✗ Terapia combinada Metformina, GLP1 |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 12 secs | 920 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 54 secs | 0 | ✗ Efecto analgésico protector gástrico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 48 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 54 secs | 0 | ✗ TZD |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 51 secs | 660 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 18 secs | 880 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 18 secs | 880 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 23 secs | 840 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 26 secs | 660 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 14 secs | 910 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 16 secs | 890 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 37 secs | 670 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 8 secs | 930 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Angie Gonzalez

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

75%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

40

✓ Correct

9

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 54 secs | 0 | ✗ propranolol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 45 secs | 700 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 34 secs | 880 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 22 secs | 920 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 52 secs | 650 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 21 secs | 860 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 20 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 35 secs | 760 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 25 secs | 830 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 22 secs | 850 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 58 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticoesteroides? | 9 secs | 970 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 18 secs | 880 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 28 secs | 810 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, ii, etc, están a cargo de: | 32 secs | 790 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 49 secs | 670 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 26 secs | 830 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 32 secs | 780 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 20 secs | 870 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 24 secs | 920 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 34 secs | 880 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 44 secs | 710 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 21 secs | 930 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 20 secs | 860 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 57 secs | 0 | ✗ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 42 secs | 860 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 19 secs | 870 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 49 secs | 670 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 30 secs | 800 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 54 secs | 640 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 19 secs | 930 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 39 secs | 870 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 56 secs | 0 | ✗ Antiinflamatorio y antipirético |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 104 secs | 0 | ✗ Son más potentes |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 54 secs | 0 | ✗ Aumentan la filtración glomerular |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 58 secs | 610 | ✓ Metformina e insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 18 secs | 880 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 60 secs | 0 | ✗ efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 53 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 48 secs | 680 | ✓ SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 42 secs | 720 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 23 secs | 850 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 27 secs | 820 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 21 secs | 860 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 29 secs | 620 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 15 secs | 900 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 20 secs | 860 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 21 secs | 820 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 22 secs | 800 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Maria Ponce (Maria Del Carmen Cortez P)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

71%
Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

38

✓ Correct

11

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 37 secs | 0 | ✗ enalapril |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 19 secs | 0 | ✗ Identificación y eliminación de factores precipitantes |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente..() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 26 secs | 910 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 17 secs | 940 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 31 secs | 790 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 30 secs | 800 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 13 secs | 910 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 24 secs | 840 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 52 secs | 0 | ✗ Síndrome de Cushing |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 21 secs | 860 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 43 secs | 0 | ✗ AINES como ibuprofeno |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 26 secs | 910 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 29 secs | 810 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 11 secs | 930 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 24 secs | 840 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 15 secs | 900 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 13 secs | 910 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 24 secs | 840 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 16 secs | 890 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 35 secs | 880 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 33 secs | 890 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 30 secs | 800 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 23 secs | 920 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 32 secs | 790 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) está indicado en: | 61 secs | 0 | ✗ Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 28 secs | 900 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 16 secs | 890 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 51 secs | 660 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 35 secs | 760 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 29 secs | 810 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 25 secs | 910 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría a: | 43 secs | 850 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 55 secs | 0 | ✗ Antiinflamatorio y antipirético |
| 38 | En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que: | 116 secs | 0 | ✗ Se administran en embarazadas |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 48 secs | 680 | ✓ Impiden reabsorción de iones Na ⁺ , Cl ⁻ |
| 40 | Tratamiento antidiabético para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 41 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 25 secs | 830 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 61 secs | 0 | ✗ efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 41 secs | 720 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 52 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 56 secs | 0 | ✗ Fluoxetina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 24 secs | 840 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 21 secs | 860 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepática es | 33 secs | 780 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Acción Prolongada | 28 secs | 630 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 23 secs | 840 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 33 secs | 780 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 22 secs | 810 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 20 secs | 820 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Jennifer Diaz

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

79%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

42

✓ Correct

4

✗ Incorrect

7

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 41 secs | 730 | ✓ metildopa |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 42 secs | 720 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 106 secs | 640 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 94 secs | 680 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 59 secs | 600 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 49 secs | 670 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 36 secs | 760 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 33 secs | 0 | ✗ Paracetamol |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 28 secs | 810 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 23 secs | 850 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 44 secs | 710 | ✓ amitriptilina |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 99 secs | 670 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 23 secs | 840 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 42 secs | 720 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de: | 57 secs | 620 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 28 secs | 810 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 47 secs | 680 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 52 secs | 650 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 35 secs | 880 | ✓ Clofibrato |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | - | - | <input type="radio"/> |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 24 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Manejo de la Hiperlipidemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 13 secs | 950 | <input checked="" type="checkbox"/> Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 40 secs | 730 | <input checked="" type="checkbox"/> Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 57 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 28 secs | 900 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 14 secs | 900 | <input checked="" type="checkbox"/> Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 23 secs | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 44 secs | 700 | <input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 40 secs | 730 | <input checked="" type="checkbox"/> Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 38 secs | 870 | <input checked="" type="checkbox"/> Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al: | 52 secs | 820 | <input checked="" type="checkbox"/> 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 26 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Antiinflamatorio y antipirético |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que: | 38 secs | 870 | <input checked="" type="checkbox"/> Producen menos tos como efecto adverso |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 44 secs | 710 | <input checked="" type="checkbox"/> Impiden reabsorción de iones Na ⁺ , Cl ⁻ |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 39 secs | 740 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina e insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 29 secs | 800 | <input checked="" type="checkbox"/> Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 33 secs | 780 | <input checked="" type="checkbox"/> Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 51 secs | 660 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 50 secs | 660 | <input checked="" type="checkbox"/> SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 42 secs | 720 | <input checked="" type="checkbox"/> Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 58 secs | 610 | <input checked="" type="checkbox"/> todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQILANTES es: | - | - | <input type="radio"/> |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 43 secs | 710 | <input checked="" type="checkbox"/> Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 29 secs | 620 | <input checked="" type="checkbox"/> DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 46 secs | 690 | <input checked="" type="checkbox"/> 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 55 secs | 630 | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 29 secs | 740 | <input checked="" type="checkbox"/> Metotrexato |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---------------|
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 32 secs | 720 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Maria Romero Quevedo (Maria Cristina Romero)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

71%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

38

✓ Correct

10

✗ Incorrect

5

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | - | - | 🕒 |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 50 secs | 0 | ✗ Identificación y eliminación de factores precipitantes |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente..() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 40 secs | 860 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 27 secs | 910 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 46 secs | 690 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 19 secs | 870 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 16 secs | 890 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 24 secs | 840 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 30 secs | 800 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 22 secs | 850 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 54 secs | 0 | ✗ AINES como ibuprofeno |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 25 secs | 910 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 41 secs | 730 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 20 secs | 870 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 26 secs | 820 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 48 secs | 680 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 17 secs | 890 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 22 secs | 850 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 20 secs | 860 | ✓ La conducción y función cardíaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 51 secs | 830 | ✓ Clofibrato |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 35 secs | 880 | ✓ Enoxaparína |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 37 secs | 750 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 30 secs | 900 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 17 secs | 880 | ✓ Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 54 secs | 640 | ✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 42 secs | 0 | ✗ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 21 secs | 860 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 46 secs | 0 | ✗ Amprenavir |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 25 secs | 830 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 36 secs | 760 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 27 secs | 910 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 22 secs | 920 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 56 secs | 0 | ✗ todas las anteriores |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 93 secs | 690 | ✓ Producen menos tos como efecto adverso |
| 39 | ¿Cuál <u>NO</u> es una característica de los diuréticos? | 51 secs | 660 | ✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 56 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca: | 20 secs | 860 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 59 secs | 0 | ✗ Efecto analgésico protector gástrico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 53 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 38 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 59 secs | 0 | ✗ Fluoxetina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 20 secs | 870 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 45 secs | 700 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 22 secs | 850 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 31 secs | 600 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 17 secs | 890 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 30 secs | 800 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 25 secs | 770 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 23 secs | 800 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Gabriela Baidal

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

67%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

36

✓ Correct

12

✗ Incorrect

5

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 57 secs | 0 | ✗ propranolol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 33 secs | 0 | ✗ Identificación y eliminación de factores precipitantes |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente..() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 21 secs | 930 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 45 secs | 850 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 27 secs | 820 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 21 secs | 860 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 19 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 25 secs | 830 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 30 secs | 800 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 42 secs | 720 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 52 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 25 secs | 910 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 21 secs | 860 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 25 secs | 830 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 29 secs | 800 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 15 secs | 900 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 11 secs | 920 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 18 secs | 880 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 15 secs | 900 | ✓ La conducción y función cardíaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 29 secs | 0 | ✗ Gemfibrozilo |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 19 secs | 930 | ✓ Enoxaparina |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 29 secs | 800 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 27 secs | 910 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 17 secs | 890 | ✓ Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 60 secs | 600 | ✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 20 secs | 930 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 15 secs | 900 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 35 secs | 770 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 19 secs | 870 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 24 secs | 840 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 17 secs | 940 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 9 secs | 970 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 60 secs | 0 | ✗ inflamatorio |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 105 secs | 0 | ✗ No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 54 secs | 0 | ✗ Aumentan la filtración glomerular |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 42 secs | 0 | ✗ Terapia combinada Metformina, GLP1 |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 27 secs | 820 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 58 secs | 0 | ✗ Efecto analgésico protector gástrico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 21 secs | 860 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 45 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 54 secs | 0 | ✗ Fluoxetina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 21 secs | 860 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 19 secs | 870 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 16 secs | 890 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | - | - | 🚫 |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 15 secs | 900 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 18 secs | 880 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 13 secs | 880 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 21 secs | 820 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Allen . (Allen Borbor)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

73%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

39

✓ Correct

9

✗ Incorrect

5

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 40 secs | 0 | ✗ salbutamol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 36 secs | 760 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 40 secs | 860 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 45 secs | 850 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 34 secs | 770 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 23 secs | 840 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 19 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 25 secs | 830 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 29 secs | 800 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 43 secs | 710 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 51 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 51 secs | 830 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 32 secs | 790 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 19 secs | 870 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, ii, etc, están a cargo de: | 44 secs | 700 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 23 secs | 850 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 27 secs | 820 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 33 secs | 780 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 70 secs | 760 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 40 secs | 860 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 39 secs | 740 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 35 secs | 880 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 23 secs | 850 | ✓ Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 58 secs | 610 | ✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 47 secs | 840 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 33 secs | 780 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 42 secs | 720 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 35 secs | 760 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 29 secs | 810 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 40 secs | 860 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 38 secs | 870 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 59 secs | 0 | ✗ inflamatorio |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 96 secs | 0 | ✗ No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 51 secs | 660 | ✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 51 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 25 secs | 830 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 58 secs | 0 | ✗ efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 31 secs | 790 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 47 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 54 secs | 0 | ✗ Sibutramina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 27 secs | 820 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 33 secs | 780 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 22 secs | 850 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 25 secs | 670 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 29 secs | 810 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 49 secs | 670 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 27 secs | 760 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 27 secs | 760 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: José Portocarrero (Abraham Portocarrero)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

69%
Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

37

✓ Correct

12

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 56 secs | 0 | ✗ enalapril |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 38 secs | 0 | ✗ Identificación y eliminación de factores precipitantes |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente..() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 20 secs | 930 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 18 secs | 940 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 13 secs | 910 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 36 secs | 760 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 12 secs | 920 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 45 secs | 700 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 34 secs | 770 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 22 secs | 850 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 53 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 50 secs | 830 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 58 secs | 610 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 18 secs | 880 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 16 secs | 0 | ✗ Proteínas |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 17 secs | 890 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 16 secs | 890 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 27 secs | 820 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 44 secs | 710 | ✓ La conducción y función cardíaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 58 secs | 800 | ✓ Clofibrato |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 25 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Ácido acetilsalicílico |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 22 secs | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 39 secs | 870 | <input checked="" type="checkbox"/> Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 14 secs | 910 | <input checked="" type="checkbox"/> Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 57 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 33 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 18 secs | 880 | <input checked="" type="checkbox"/> Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 36 secs | 760 | <input checked="" type="checkbox"/> Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 34 secs | 770 | <input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 22 secs | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 32 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 27 secs | 910 | <input checked="" type="checkbox"/> 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 49 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> todas las anteriores |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 102 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Son más potentes |
| 39 | ¿Cuál <u>NO</u> es una característica de los diuréticos? | 38 secs | 740 | <input checked="" type="checkbox"/> Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 51 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca: | 23 secs | 840 | <input checked="" type="checkbox"/> Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 57 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Efecto daño gástrico y daño plaquetario |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 8 secs | 940 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 53 secs | 650 | <input checked="" type="checkbox"/> SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 45 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Sibutramina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 56 secs | 620 | <input checked="" type="checkbox"/> todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 36 secs | 760 | <input checked="" type="checkbox"/> Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 24 secs | 840 | <input checked="" type="checkbox"/> Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 31 secs | 600 | <input checked="" type="checkbox"/> DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH inicio | 16 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 21 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Tolerancia a la glucosaResistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 17 secs | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 21 secs | 820 | <input checked="" type="checkbox"/> Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Rommy Zambrano (Rommy Zambrano)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

77%
Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

41

✓ Correct

7

✗ Incorrect

5

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 46 secs | 690 | ✓ metildopa |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 40 secs | 0 | ✗ Imaginar la lectrofisiología del corazón como un objetivo en movimiento |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 54 secs | 820 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretinico se refiere a | 36 secs | 880 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 31 secs | 790 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 31 secs | 790 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 29 secs | 810 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 36 secs | 760 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 38 secs | 750 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 29 secs | 0 | ✗ Aumento de la excreción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 45 secs | 700 | ✓ amitriptilina |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 47 secs | 840 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 45 secs | 700 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 24 secs | 840 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de: | 34 secs | 770 | ✓ Ninguno |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 34 secs | 770 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 36 secs | 760 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 32 secs | 790 | ✓ La conducción y función cardíaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 35 secs | 0 | ✗ Simvastatina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 33 secs | 890 | ✓ Enoxaparina |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 34 secs | 770 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 55 secs | 810 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 37 secs | 0 | ✗ Tenofovir + Emtricitabina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 44 secs | 0 | ✗ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 55 secs | 810 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 36 secs | 760 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 33 secs | 780 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 39 secs | 740 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 44 secs | 710 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 34 secs | 880 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 32 secs | 890 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 39 secs | 740 | ✓ inmunosupresión |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 91 secs | 690 | ✓ Producen menos tos como efecto adverso |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 47 secs | 690 | ✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 46 secs | 690 | ✓ Metformina e insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca: | 47 secs | 0 | ✗ Nodulo Auriculo ventricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 55 secs | 630 | ✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 54 secs | 640 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 56 secs | 620 | ✓ SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 54 secs | 640 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 55 secs | 630 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 55 secs | 630 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 54 secs | 640 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 27 secs | 0 | ✗ DegludecDetemir |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 52 secs | 650 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 54 secs | 640 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 40 secs | 640 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 40 secs | 640 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Maria Andrea Martinez (Maria Andrea Martinez)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

62%
Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

33

✓ Correct

16

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 17 secs | 0 | ✗ enalapril |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 6 secs | 960 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 36 secs | 880 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretinico se refiere a | 24 secs | 920 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 8 secs | 950 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 8 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 12 secs | 920 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 29 secs | 800 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 11 secs | 920 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 13 secs | 910 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 16 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 6 secs | 980 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 12 secs | 920 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 6 secs | 960 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 9 secs | 940 | ✓ Ninguno |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 33 secs | 780 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 7 secs | 950 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 14 secs | 910 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 16 secs | 890 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 10 secs | 960 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 6 secs | 980 | ✓ Enoxaparina |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicacion: | 19 secs | 870 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 78 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Enoxaparina |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 34 secs | 770 | <input checked="" type="checkbox"/> Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 22 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 29 secs | 900 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 17 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 14 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Amprenavir |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 17 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 13 secs | 910 | <input checked="" type="checkbox"/> Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 11 secs | 960 | <input checked="" type="checkbox"/> Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 7 secs | 970 | <input checked="" type="checkbox"/> 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 12 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> todas las anteriores |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que: | 95 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 51 secs | 660 | <input checked="" type="checkbox"/> Impiden reabsorción de iones Na ⁺ , Cl ⁻ |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 43 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 14 secs | 910 | <input checked="" type="checkbox"/> Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 37 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 20 secs | 870 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 24 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 32 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Dietilpropion |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 9 secs | 940 | <input checked="" type="checkbox"/> todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 43 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Ondansetron |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 3 secs | 980 | <input checked="" type="checkbox"/> Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 25 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> DegludécDetemir |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 35 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 30/60 Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 24 secs | 840 | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 27 secs | 760 | <input checked="" type="checkbox"/> Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 24 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Todas las anteriores |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: karelys tomala

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

67%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

36

✓ Correct

13

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 26 secs | 0 | ✗ enalapril |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 49 secs | 670 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 37 secs | 870 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 16 secs | 940 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 34 secs | 770 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 15 secs | 900 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 15 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 27 secs | 820 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 22 secs | 850 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 36 secs | 760 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 52 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 14 secs | 950 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 27 secs | 820 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 28 secs | 810 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, ii, etc, están a cargo de: | 32 secs | 790 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 23 secs | 850 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 10 secs | 930 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 18 secs | 880 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 26 secs | 820 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 41 secs | 0 | ✗ Gemfibrozilo |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 30 secs | 900 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 42 secs | 720 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 29 secs | 900 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 19 secs | 870 | ✓ Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 54 secs | 0 | ✗ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 26 secs | 910 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 35 secs | 760 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 46 secs | 690 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 28 secs | 810 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 40 secs | 730 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 18 secs | 0 | ✗ Alta |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 13 secs | 950 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 40 secs | 0 | ✗ todas las anteriores |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 70 secs | 0 | ✗ No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 53 secs | 0 | ✗ Incrementan el volumen de orina eliminado |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 51 secs | 0 | ✗ Terapia combinada Metformina, GLP1 |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca: | 30 secs | 800 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 50 secs | 670 | ✓ Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 22 secs | 850 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 48 secs | 680 | ✓ SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 50 secs | 0 | ✗ Fluoxetina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 28 secs | 810 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 50 secs | 660 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 19 secs | 870 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 31 secs | 0 | ✗ DegludecGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 19 secs | 870 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 54 secs | 0 | ✗ Resistencia a la glucosaResistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 16 secs | 860 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 21 secs | 810 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Erick Ramirez (Erick Ramirez)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

71%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

38

✓ Correct

6

✗ Incorrect

9

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | - | - | 🕒 |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 33 secs | 780 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 114 secs | 620 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 24 secs | 920 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 43 secs | 710 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 35 secs | 770 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 26 secs | 820 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 44 secs | 710 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 36 secs | 760 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 50 secs | 660 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | - | - | 🕒 |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 32 secs | 890 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 59 secs | 600 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 14 secs | 910 | ✓ Riñón |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, II, etc, están a cargo de: | 44 secs | 700 | ✓ Ninguno |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 26 secs | 830 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 28 secs | 810 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 26 secs | 830 | ✓ La conducción y función cardíaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 51 secs | 830 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | - | - | 🕒 |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 28 secs | 810 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 23 secs | 920 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 36 secs | 760 | ✓ Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 52 secs | 0 | ✗ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 57 secs | 810 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 26 secs | 830 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 48 secs | 680 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 41 secs | 720 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 30 secs | 800 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 26 secs | 910 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 18 secs | 940 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 57 secs | 0 | ✗ todas las anteriores |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 99 secs | 670 | ✓ Producen menos tos como efecto adverso |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 47 secs | 0 | ✗ Aumentan la filtración glomerular |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 57 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 29 secs | 810 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 50 secs | 0 | ✗ efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 39 secs | 740 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | - | - | ⊖ |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 60 secs | 0 | ✗ Fluoxetina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 27 secs | 820 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 27 secs | 820 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 45 secs | 700 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 29 secs | 610 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 31 secs | 790 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 24 secs | 840 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 36 secs | 680 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 33 secs | 700 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Luisa Guerra

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

66%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

35

✓ Correct

14

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 54 secs | 0 | ✗ salbutamol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 58 secs | 610 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 102 secs | 0 | ✗ Añado insulina cristalina |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | 1 secs | 1000 | ✓ inhibidor de dispetilpeptidasa 4 |
| 7 | Efecto Incretinico se refiere a | 109 secs | 0 | ✗ disminuye el vaciamiento gástrico |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 44 secs | 700 | ✓ Falla de células beta pancríaticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 46 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 51 secs | 660 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 38 secs | 740 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 11 secs | 930 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 14 secs | 900 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 57 secs | 0 | ✗ AINES como ibuprofeno |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 5 secs | 980 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 59 secs | 610 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 32 secs | 790 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 44 secs | 0 | ✗ Todas |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 50 secs | 660 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 56 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 53 secs | 650 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 21 secs | 930 | ✓ Clofibrato |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 30 secs | 900 | ✓ Enoxaparina |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 19 secs | 870 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 12 secs | 960 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 21 secs | 860 | ✓ Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 44 secs | 0 | ✗ Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 23 secs | 920 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 14 secs | 910 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 37 secs | 750 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 16 secs | 890 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 38 secs | 750 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 17 secs | 940 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 22 secs | 920 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 61 secs | 0 | ✗ Antiinflamatorio y antipirético |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que: | 91 secs | 0 | ✗ Se administran en embarazadas |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 54 secs | 0 | ✗ Aumentan la filtración glomerular |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 61 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 31 secs | 790 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 57 secs | 0 | ✗ Efecto daño gástrico y daño plaquetario |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 22 secs | 850 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 61 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 41 secs | 730 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 19 secs | 870 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 9 secs | 940 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 11 secs | 920 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 17 secs | 780 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 18 secs | 880 | ✓ 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 10 secs | 930 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 2 secs | 980 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 2 secs | 980 | ✓ Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Gabriela Espinosa

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

62%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

33

✓ Correct

14

✗ Incorrect

6

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 28 secs | 810 | ✓ metildopa |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 16 secs | 890 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 34 secs | 880 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretinico se refiere a | 25 secs | 0 | ✗ mejora la secrecion de insulina |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 44 secs | 710 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 36 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 21 secs | 860 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 52 secs | 0 | ✗ Diclofenaco |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 22 secs | 850 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 55 secs | 630 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 23 secs | 850 | ✓ amitriptilina |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 63 secs | 790 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 49 secs | 670 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 38 secs | 750 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, li, etc, están a cargo de: | 31 secs | 0 | ✗ Proteinas |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 48 secs | 0 | ✗ Falso |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 42 secs | 720 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 27 secs | 820 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 43 secs | 0 | ✗ Ezetimiba |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | - | - | <input type="radio"/> |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 33 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Manejo de la Hiperlipidemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 91 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Rivaroxabán |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 21 secs | 860 | <input checked="" type="checkbox"/> Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 53 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 31 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 10 secs | 930 | <input checked="" type="checkbox"/> Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 22 secs | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 17 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 19 secs | 870 | <input checked="" type="checkbox"/> Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 14 secs | 950 | <input checked="" type="checkbox"/> Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al: | 30 secs | 900 | <input checked="" type="checkbox"/> 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 29 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Antiinflamatorio y antipirético |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (ECA) es que: | 49 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Son más potentes |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 51 secs | 660 | <input checked="" type="checkbox"/> Impiden reabsorción de iones Na ⁺ , Cl ⁻ |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 58 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 26 secs | 830 | <input checked="" type="checkbox"/> Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 27 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Efecto analgésico protector gástrico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 22 secs | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 48 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 14 secs | 910 | <input checked="" type="checkbox"/> Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 14 secs | 910 | <input checked="" type="checkbox"/> todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 16 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 10 secs | 930 | <input checked="" type="checkbox"/> Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 21 secs | 720 | <input checked="" type="checkbox"/> DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 12 secs | 920 | <input checked="" type="checkbox"/> 1hr30Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 7 secs | 950 | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 22 secs | 800 | <input checked="" type="checkbox"/> Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 20 secs | 820 | <input checked="" type="checkbox"/> Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Yuleidy Aroca

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

64%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

34

✓ Correct

12

✗ Incorrect

7

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 26 secs | 0 | ✗ propranolol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 27 secs | 0 | ✗ Identificación y eliminación de factores precipitantes |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente..() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 34 secs | 880 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 24 secs | 920 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 37 secs | 750 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 45 secs | 700 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | - | - | 🕒 |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 58 secs | 0 | ✗ Paracetamol |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 16 secs | 890 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 18 secs | 880 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 54 secs | 640 | ✓ amitriptilina |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 27 secs | 910 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 58 secs | 610 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 45 secs | 700 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 35 secs | 770 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 12 secs | 920 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 25 secs | 830 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 24 secs | 840 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 29 secs | 810 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 18 secs | 940 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 16 secs | 940 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 55 secs | 630 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 23 secs | 920 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 53 secs | 640 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | - | - | ⊘ |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 96 secs | 680 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 56 secs | 630 | ✓ Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 46 secs | 690 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 22 secs | 850 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 19 secs | 870 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 15 secs | 950 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 18 secs | 940 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 48 secs | 680 | ✓ inmunosupresión |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que: | 82 secs | 0 | ✗ No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 53 secs | 640 | ✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 43 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 23 secs | 840 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 57 secs | 0 | ✗ efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 21 secs | 860 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 35 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 55 secs | 630 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 52 secs | 650 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 58 secs | 0 | ✗ Betametasona |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 27 secs | 820 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | - | - | ⊘ |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 47 secs | 0 | ✗ 12/24 hrs |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 53 secs | 0 | ✗ Tolerancia a la glucosaSensibilidad a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 47 secs | 0 | ✗ Imatinib |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 20 secs | 0 | ✗ Todas las anteriores |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Sandra Elizabeth Borbor Cedeño (Sandra Elizabeth Borbor C)
Accuracy % (correct / total)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

53

Total Questions

29

Correct

18

Incorrect

6

Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 26 secs | 820 | ✓ metildopa |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | ⊗ |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 32 secs | 790 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | ⊗ |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 37 secs | 870 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | ⊗ |
| 7 | Efecto incretínico se refiere a | 76 secs | 740 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 11 secs | 930 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | ⊗ |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 21 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 46 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 55 secs | 0 | ✗ Diclofenaco |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 15 secs | 900 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 14 secs | 900 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 59 secs | 0 | ✗ AINES como paracetamol |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 29 secs | 900 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | - | - | ⊗ |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 8 secs | 950 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, II, etc, están a cargo de: | 12 secs | 920 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 19 secs | 0 | ✗ Falso |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | ⊗ |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 20 secs | 860 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 12 secs | 920 | ✓ La conducción y función cardíaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 61 secs | 0 | ✗ Ezetimiba |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 48 secs | 840 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 31 secs | 790 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 40 secs | 860 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 6 secs | 960 | ✓ Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 20 secs | 0 | ✗ Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 94 secs | 680 | ✓ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 22 secs | 0 | ✗ Mielosupresion |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 32 secs | 0 | ✗ Amprenavir |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 16 secs | 890 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual NO le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 12 secs | 920 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 25 secs | 910 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 21 secs | 930 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 47 secs | 690 | ✓ inmunosupresión |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que: | 53 secs | 0 | ✗ No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 28 secs | 0 | ✗ Aumentan la filtración glomerular |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C > 8.5% | 48 secs | 0 | ✗ Insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 47 secs | 690 | ✓ Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 56 secs | 0 | ✗ efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer linea para un paciente con Diabetes tipo II | 5 secs | 960 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 42 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 32 secs | 0 | ✗ Dietilpropion |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 53 secs | 0 | ✗ Agentes Alquilantes |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 32 secs | 780 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 27 secs | 820 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 32 secs | 600 | ✓ DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 12 secs | 0 | ✗ 30/60 Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 45 secs | 700 | ✓ Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 18 secs | 840 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 35 secs | 0 | ✗ Rituximab |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Michelle Stephania Loja Vera (Michelle Loja Vera)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

60%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

32

✓ Correct

15

✗ Incorrect

6

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 20 secs | 0 | ✗ propranolol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 39 secs | 740 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 34 secs | 0 | ✗ Añado insulina cristalina |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretinico se refiere a | 71 secs | 0 | ✗ Efecto pleiotropico sistémico, mejorando la captación de glucosa, |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 22 secs | 850 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 42 secs | 720 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 43 secs | 710 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 49 secs | 0 | ✗ Diclofenaco |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 52 secs | 650 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 11 secs | 930 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 51 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 25 secs | 910 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 26 secs | 820 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 18 secs | 880 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, II, etc, están a cargo de: | 40 secs | 0 | ✗ Todas |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 41 secs | 720 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 49 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 34 secs | 770 | ✓ La conducción y función cardíaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 91 secs | 690 | ✓ Clofibrato |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | - | - | <input type="radio"/> |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 52 secs | 650 | <input checked="" type="checkbox"/> Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 59 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Enoxaparina |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 51 secs | 660 | <input checked="" type="checkbox"/> Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 53 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de linfocitos CD4 <350cel/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 87 secs | 710 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 44 secs | 700 | <input checked="" type="checkbox"/> Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 25 secs | 830 | <input checked="" type="checkbox"/> Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 32 secs | 780 | <input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 42 secs | 720 | <input checked="" type="checkbox"/> Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 84 secs | 720 | <input checked="" type="checkbox"/> Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 37 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 70% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 51 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> inflamatorio |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) es que: | 91 secs | 690 | <input checked="" type="checkbox"/> Producen menos tos como efecto adverso |
| 39 | ¿Cuál <u>NO</u> es una característica de los diuréticos? | 54 secs | 640 | <input checked="" type="checkbox"/> Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 50 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Terapia combinada Metformina, GLP1 |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 46 secs | 690 | <input checked="" type="checkbox"/> Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 32 secs | 790 | <input checked="" type="checkbox"/> Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 22 secs | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 36 secs | 760 | <input checked="" type="checkbox"/> SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 49 secs | 670 | <input checked="" type="checkbox"/> Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 42 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Agentes Alquilantes |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 45 secs | 700 | <input checked="" type="checkbox"/> Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 44 secs | 700 | <input checked="" type="checkbox"/> Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 28 secs | 620 | <input checked="" type="checkbox"/> DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 45 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/6 hrs |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 48 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilidad a la insulinaResistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 42 secs | 620 | <input checked="" type="checkbox"/> Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 46 secs | 600 | <input checked="" type="checkbox"/> Vinblastina |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Irene Rodríguez (Irene Rodríguez)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

58%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

31

✓ Correct

15

✗ Incorrect

7

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 23 secs | 850 | ✓ metildopa |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 57 secs | 0 | ✗ Establecimiento de los objetivos de la terapéutica |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 64 secs | 780 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto incretínico se refiere a | 99 secs | 670 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 49 secs | 670 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 47 secs | 680 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 17 secs | 890 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 58 secs | 610 | ✓ Oxaprozina |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 52 secs | 650 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 60 secs | 600 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 40 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 107 secs | 0 | ✗ Un paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente durante 6 meses para la rinitis alérgica |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 54 secs | 640 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 19 secs | 870 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 57 secs | 0 | ✗ Todas |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina | 50 secs | 660 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 60 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 26 secs | 820 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 33 secs | 890 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 12 secs | 960 | ✓ Enoxaparina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 48 secs | 680 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 19 secs | 930 | ✓ Alteplasa |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 21 secs | 860 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) está indicado en: | 55 secs | 0 | ✗ Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista |
| 30 | Cuáles son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 111 secs | 0 | ✗ Inhibidores de proteasas |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 37 secs | 0 | ✗ Reacción exantémica |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 49 secs | 0 | ✗ Amprenavir |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 10 secs | 930 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cuál <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 15 secs | 900 | ✓ Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 95 Puls/min; Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 113 secs | 620 | ✓ Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardíaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al: | 103 secs | 650 | ✓ 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 55 secs | 0 | ✗ todas las anteriores |
| 38 | En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que: | 106 secs | 640 | ✓ Producen menos tos como efecto adverso |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 59 secs | 600 | ✓ Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabético para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 61 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 60 secs | 600 | ✓ Nódulo sinauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 57 secs | 0 | ✗ efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 56 secs | 620 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 55 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 43 secs | 710 | ✓ Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 33 secs | 780 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 46 secs | 690 | ✓ Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepática es | 28 secs | 810 | ✓ Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Acción Prolongada | - | - | ⊗ |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 45 secs | 0 | ✗ 12/24 hrs |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 51 secs | 0 | ✗ Sensibilidad a la insulina Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 28 secs | 750 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | - | - | ⊗ |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Fiorella Hernández

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

47%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

25

✓ Correct

20

✗ Incorrect

8

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 45 secs | 0 | ✗ salbutamol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 30 secs | 800 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 80 secs | 730 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretinico se refiere a | 11 secs | 960 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 5 secs | 0 | ✗ Obesidad |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 50 secs | 660 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 50 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 54 secs | 0 | ✗ Diclofenaco |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 61 secs | 0 | ✗ Síndrome de Cushing |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 30 secs | 800 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 45 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 4 secs | 980 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | - | - | 🕒 |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 22 secs | 850 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 54 secs | 0 | ✗ Lípidos |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 43 secs | 710 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 46 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 59 secs | 600 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 43 secs | 850 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 30 secs | 900 | ✓ Enoxaparina |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicacion: | 42 secs | 720 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 111 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Enoxaparina |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 32 secs | 780 | <input checked="" type="checkbox"/> Zidovudina + Lamibudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 56 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 111 secs | 630 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 50 secs | 670 | <input checked="" type="checkbox"/> Disminución de las enzimas hepáticas |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 25 secs | 830 | <input checked="" type="checkbox"/> Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 55 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Pilonefritis |
| 34 | De los siguientes pácientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 37 secs | 750 | <input checked="" type="checkbox"/> Transplantado |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 8 secs | 970 | <input checked="" type="checkbox"/> Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 11 secs | 960 | <input checked="" type="checkbox"/> 100% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | - | - | <input type="checkbox"/> |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que: | 105 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál <u>NO</u> es una característica de los diuréticos? | 60 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Incrementan el volumen de orina eliminado |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 57 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Terapia combinada Metformina, GLP1 |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 22 secs | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 62 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 31 secs | 790 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la pérdida de peso | 60 secs | 600 | <input checked="" type="checkbox"/> SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 59 secs | 610 | <input checked="" type="checkbox"/> Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 49 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Agentes Alquilantes |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 60 secs | 600 | <input checked="" type="checkbox"/> Cisplatino |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 58 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 29 secs | 620 | <input checked="" type="checkbox"/> DetemirGlargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 37 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 12/24 hrs |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 57 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Tolerancia a la glucosaSensibilidad a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | - | - | <input type="checkbox"/> |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 19 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Loperamida |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Melanie Paredes

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

39%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

21

✓ Correct

29

✗ Incorrect

3

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 28 secs | 810 | ✓ metildopa |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 28 secs | 810 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 27 secs | 910 | ✓ Añado insulina NPH |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 18 secs | 940 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 17 secs | 0 | ✗ Obesidad |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | 29 secs | 0 | ✗ Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológica Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 25 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 6 secs | 960 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 16 secs | 0 | ✗ Diclofenaco |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 14 secs | 900 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 32 secs | 0 | ✗ Estimulación del eje hipotalámico-hipófisis-adrenal |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 16 secs | 0 | ✗ AINES como ibuprofeno |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 26 secs | 910 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 19 secs | 870 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 23 secs | 850 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, ii, etc, están a cargo de: | 35 secs | 760 | ✓ Ninguno |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 13 secs | 0 | ✗ Falso |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 16 secs | 890 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 21 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 20 secs | 860 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 30 secs | 0 | ✗ Gemfibrozilo |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 18 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Ácido acetilsalicílico |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 16 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 39 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Rivaroxabán |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 10 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Abacavir + Didanosina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 34 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 27 secs | 910 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 17 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Mielosupresion |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 8 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Amprenavir |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 31 secs | 790 | <input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 35 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Dialisis peritoneal |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 24 secs | 920 | <input checked="" type="checkbox"/> Moderada |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 24 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 70% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 15 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> todas las anteriores |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertora de angiotensina (IECA) es que: | 37 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Son más potentes |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 16 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Incrementan el volumen de orina eliminado |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 15 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Insulina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca: | 31 secs | 790 | <input checked="" type="checkbox"/> Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 23 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Efecto analgésico protector gástrico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 14 secs | 910 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 20 secs | 860 | <input checked="" type="checkbox"/> SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 21 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Sibutramina |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 15 secs | 900 | <input checked="" type="checkbox"/> todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 13 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Betametasona |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 21 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> GLP1 y Corticoides |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 13 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> DegludécAnálogos de Insulina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 16 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 12/24 hrs |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 43 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la glucosaResistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 12 secs | 890 | <input checked="" type="checkbox"/> Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 19 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Todas las anteriores |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Domenica Feijoó (Domenica Feijoó)

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

41%
Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

22

✓ Correct

27

✗ Incorrect

4

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 20 secs | 0 | ✗ propranolol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 28 secs | 810 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 27 secs | 0 | ✗ Añado insulina cristalina |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 59 secs | 800 | ✓ Todas las anteriores |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 28 secs | 810 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 14 secs | 0 | ✗ Verdadero |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 20 secs | 870 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 41 secs | 0 | ✗ Diclofenaco |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 20 secs | 860 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 27 secs | 820 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 35 secs | 770 | ✓ amitriptilina |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 22 secs | 920 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 41 secs | 730 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 17 secs | 880 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, II, etc, están a cargo de: | 14 secs | 0 | ✗ Todas |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 5 secs | 0 | ✗ Falso |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 24 secs | 840 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 23 secs | 850 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 27 secs | 0 | ✗ La función neuromuscular |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 90 secs | 0 | ✗ Ezetimiba |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 40 secs | 0 | ✗ Rivaroxabán |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 37 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Manejo de la Hiperlipidemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 52 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Rivaroxabán |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 32 secs | 790 | <input checked="" type="checkbox"/> Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) está indicado en: | 48 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 95 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 45 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Mielosupresion |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 10 secs | 930 | <input checked="" type="checkbox"/> Maravíroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 45 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrítico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 18 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Dialisis peritoneal |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 15 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Leve |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 19 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 60% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 25 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> todas las anteriores |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (ECA) es que: | 17 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Se administran en embarazadas |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 42 secs | 720 | <input checked="" type="checkbox"/> Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 34 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | 47 secs | 680 | <input checked="" type="checkbox"/> Nodulo sinoauricular |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 49 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Efecto analgésico protector gástrico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 50 secs | 660 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 44 secs | 710 | <input checked="" type="checkbox"/> SGLT2 o GLP1 |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 29 secs | 810 | <input checked="" type="checkbox"/> Orlistat |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 31 secs | 790 | <input checked="" type="checkbox"/> todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 43 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Rituximab |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 49 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 30 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Degludec/Detemir/Glargina |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 49 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/6 hrs |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 41 secs | 720 | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 39 secs | 660 | <input checked="" type="checkbox"/> Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 40 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Todas las anteriores |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Samantha Montoya

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

37%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

20

✓ Correct

24

✗ Incorrect

9

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 25 secs | 0 | ✗ salbutamol |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 50 secs | 670 | ✓ Todas las anteriores |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardiacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 31 secs | 0 | ✗ añadido otro ADO |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretinico se refiere a | 88 secs | 0 | ✗ mejora la secrecion de insulina |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 17 secs | 880 | ✓ Falla de células beta pancreáticas |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | - | - | 🕒 |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 29 secs | 800 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 27 secs | 820 | ✓ Verdadero |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 51 secs | 0 | ✗ Diclofenaco |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 40 secs | 730 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 51 secs | 660 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 60 secs | 0 | ✗ AINES como ibuprofeno |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 30 secs | 900 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 30 secs | 0 | ✗ Es un derivado opiáceo. |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 31 secs | 790 | ✓ Riñon |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de: | 55 secs | 0 | ✗ Proteínas |
| 20 | Higado es el principal órgano hematopoyetico en la primera semana extrauterina | 31 secs | 790 | ✓ Verdadero |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | - | - | 🕒 |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 49 secs | 670 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 41 secs | 730 | ✓ La conducción y función cardiaca |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 71 secs | 760 | ✓ Clofibrato |
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | - | - | 🕒 |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|---|
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 51 secs | 660 | ✓ Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 51 secs | 0 | ✗ Enoxaparina |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 10 secs | 930 | ✓ Zidovudina + Lamivudina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 52 secs | 650 | ✓ Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/ml |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 81 secs | 0 | ✗ Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos no nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 47 secs | 0 | ✗ Mielosupresion |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 32 secs | 790 | ✓ Maraviroc |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 54 secs | 640 | ✓ Síndrome Nefrótico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 45 secs | 0 | ✗ Dialisis peritoneal |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 32 secs | 0 | ✗ Leve |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaria al: | 34 secs | 0 | ✗ 60% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | - | - | ⊗ |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) es que: | 28 secs | 0 | ✗ No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál <u>NO</u> es una característica de los diuréticos? | 33 secs | 0 | ✗ Aumentan la reabsorción de bicarbonatos |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 51 secs | 0 | ✗ Terapia combinada Metformina, GLP1 |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardíaca: | - | - | ⊗ |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 41 secs | 0 | ✗ Efecto daño gástrico y daño plaquetario |
| 43 | Fármaco primer linea para un paciente con Diabetes tipo II | 9 secs | 940 | ✓ Metformina |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 10 secs | 0 | ✗ Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 46 secs | 0 | ✗ Dietilpropion |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 7 secs | 950 | ✓ todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 59 secs | 0 | ✗ Ondansetron |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 47 secs | 0 | ✗ Ninguna de las anteriores |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | - | - | ⊗ |
| 50 | Insulina NPH Inicio | 38 secs | 0 | ✗ 12/24 hrs |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 45 secs | 0 | ✗ Resistencia a la glucosa Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 39 secs | 650 | ✓ Metotrexato |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 38 secs | 0 | ✗ Todas las anteriores |

Quizizz

Quiz Name: Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student: Carlos Gonzalez Alvarado

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

24%

Accuracy % (correct / total)

53

Total Questions

13

✓ Correct

37

✗ Incorrect

3

🕒 Unattempted

Questions

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 1 | Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer embarazada | 17 secs | 0 | ✗ enalapril |
| 2 | ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? | - | - | 🕒 |
| 3 | Son principios del uso clínico de antiarrítmicos: | 32 secs | 0 | ✗ Minimización de los riesgos |
| 4 | Ocasionalmente se ha usado para el tratamiento de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...() | - | - | 🕒 |
| 5 | En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ? | 25 secs | 0 | ✗ Añado insulina cristalina |
| 6 | Saxagliptina es un fármaco.. | - | - | 🕒 |
| 7 | Efecto Incretínico se refiere a | 75 secs | 0 | ✗ mejora la secreción de insulina |
| 8 | De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I | 26 secs | 0 | ✗ Síndrome metabólico |
| 9 | ¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa) | 31 secs | 0 | ✗ Es importante el consumo de ensaldas, vegetales verdes para su efectividad farmacológica Es necesario observar si consume algún diurético ahorrador de K para el control hidroelectrolítico |
| 10 | El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: | 12 secs | 920 | ✓ Falso |
| 11 | La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario | 16 secs | 0 | ✗ Falso |
| 12 | Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h | 15 secs | 0 | ✗ Ketoprofeno |
| 13 | ¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los siguientes trastornos? | 11 secs | 930 | ✓ Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 14 | ¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de glucocorticoides? | 12 secs | 920 | ✓ Inhibición de la absorción de calcio |
| 15 | tratamiento de primera línea para dolor neuropático | 18 secs | 0 | ✗ OPIOIDE: codeína |
| 16 | ¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con corticosteroides? | 35 secs | 880 | ✓ Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide |
| 17 | Un característica de un analgésico narcótico es: | 12 secs | 920 | ✓ Todas las anteriores |
| 18 | Eritropoyetina se produce en: | 19 secs | 870 | ✓ Riñón |
| 19 | Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, ii, etc, están a cargo de: | 48 secs | 0 | ✗ Grasas |
| 20 | Hígado es el principal órgano hematopoyético en la primera semana extrauterina | 26 secs | 0 | ✗ Falso |
| 21 | LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL PLASMA | 23 secs | 840 | ✓ Verdadero |
| 22 | Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo renal postrenal. | 36 secs | 760 | ✓ Falso |
| 23 | Los desequilibrios de potasio afectan principalmente | 19 secs | 0 | ✗ El equilibrio osmolar |
| 24 | Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiente con atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más recomendado incorporar en este paciente? | 26 secs | 0 | ✗ Simvastatina |

| No. | Question | Time Taken | Score | Response |
|-----|---|------------|-------|--|
| 25 | Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente? | 30 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Rivaroxabán |
| 26 | El gemfibrozilo tiene como principal indicación: | 36 secs | 760 | <input checked="" type="checkbox"/> Manejo de la Hipertrigliceridemia |
| 27 | Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado administrar de manera inmediata a este paciente? | 15 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Enoxaparína |
| 28 | La combinación Combivir contiene: | 10 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Abacavir + Didanosina |
| 29 | El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta indicado en: | 21 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Carga viral VIH >100,000cop/ml o infección oportunista |
| 30 | Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son considerados el backbone del tratamiento? | 47 secs | 840 | <input checked="" type="checkbox"/> Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleosidos |
| 31 | Cual <u>NO</u> corresponde a un efecto adverso de los INNTI | 31 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Astenia-adinamia |
| 32 | Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es | 16 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Dolutegravir |
| 33 | La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina: | 35 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Síndrome Nefrítico |
| 34 | De los siguientes pacientes a cual <u>NO</u> le realizaría tratamiento de fisioterapia al 3 día postratamiento de: | 32 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Farmacologico |
| 35 | Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de filtración glomerular de 60dl/min, la prescripción del ejercicio ud la prescribiría a intensidad: | 27 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| 36 | Paciente de 20 años deportista con tasa de filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una actividad aeróbica la trabajaría al: | 29 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 70% |
| 37 | Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente? | 36 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> inflamatorio |
| 38 | En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) es que: | 64 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> No producen Hiperpotasemia |
| 39 | ¿Cuál NO es una característica de los diuréticos? | 25 secs | 830 | <input checked="" type="checkbox"/> Impiden reabsorción de iones Na+, Cl- |
| 40 | Tratamiento antidiabetico para <u>pacientes pediátricos</u> con A1C > 8.5% | 19 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Terapia combinada Metformina, GLP1 |
| 41 | Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la frecuencia cardiaca: | 42 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Haz de Hiz |
| 42 | El efecto que tiene la COX1 es principalmente | 54 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> efecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico |
| 43 | Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II | 9 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> GLP-1 |
| 44 | Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene enfermedades CDV establecidas y es necesario promover la pérdida de peso | 21 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Metformina |
| 45 | Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el tratamiento de Obesidad son los siguientes | 14 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Dietilpropion |
| 46 | LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS INCLUYEN | 9 secs | 940 | <input checked="" type="checkbox"/> todas |
| 47 | Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es: | 14 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Ondansetron |
| 48 | La terapia ideal para la esteatosis hepatica es | 20 secs | 860 | <input checked="" type="checkbox"/> Vitamina E y pioglitazona |
| 49 | Insulina Accion Prolongada | 17 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Analogos de Insulina Glargina |
| 50 | Insulina NPH inicio | 10 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 30/60 Min |
| 51 | La incapacidad de la insulina en cantidades normales para desencadenar la respuesta esperada se denomina: | 23 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la glucosa Resistencia a la insulina |
| 52 | Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de los antimetabolitos es: | 10 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Imatinib |
| 53 | Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca es: | 23 secs | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Loperamida |

